BROTIZOLAM: REVIEW OF CLINICAL STUDIES

A. N. NICHOLSON

It is perhaps in the development of hypnotics that the most critical appraisal of a new drug is likely to be encountered. Considerable expertise is now brought to bear on their assessment from the many disciplines within pharmacokinetics and pharmacodynamics, and many believe that we already have too many, though often the advantage of different drugs in the management of insomnia is not entirely appreciated.

Uncertainty concerning the place of hypnotics in the management of sleep difficulties has also arisen because insomnia itself and its many manifestations are little understood. Transient insomnia in an active individual involved in skilled work presents a very different problem from that of recurring insomnia in patients with anxiety, and, as hypnotics have different profiles, it is important that the nature of the sleep disturbance is understood before such drugs are used.

As far as transient insomnia is concerned it is necessary to decide whether the sleep disturbance involves difficulty in falling asleep or in staying asleep. The question must also be answered whether a drug will be used only occasionally or whether it may be needed repeatedly, and whether the nature of the daytime work is such that any residual sedative effect must be avoided. Further, in some patients anxiety may be the symptom of primary concern. All these aspects must be borne in mind because appropriate management depends on the clinical picture.

Duration of action is particularly relevant to the use of hypnotics, and over the past few years the factors which influence duration of action have become increasingly clear. Hypnotics with persistent activity extending well into the next day have a part to play in the treatment of insomnia—especially if there is an anxiety component—even though they are likely to accumulate with daily ingestion, but there is increasing awareness that hypnotics with a relatively rapid fall in plasma level due either to a sustained distribution phase or to rapid elimination are appropriate to the management of transient insomnia.

Drugs which are rapidly eliminated—sometimes called the third generation of hypnotics—include brotizolam. However, even within this group, the various drugs have different rates of decay of plasma levels and so they may sustain sleep to varying degrees. It is in the context of sustaining sleep during the night without residual effects the next day that brotizolam may have a particular place in therapeutics.

Brotizolam has high affinity to the benzodiazepine

receptor. It is a potent hypnotic which is extensively absorbed and it is metabolised into hydroxylated compounds which are rapidly eliminated. It is free of long-acting metabolites, and with multiple dose treatment there is no tendency for accumulation. Using radio receptor assay the decay of the active hypnotic principle is estimated around 5 h. The elimination half-life is slightly longer in the elderly, but it is still relatively rapid, and so accumulation with daily use is unlikely. There is also no accumulation in renal failure even with creatinine clearances of less than 15 mg min⁻¹, and so no dose adjustment is required when brotizolam is used in renal failure. However, in some patients with cirrhosis there may be a decrease in clearance, and lower doses should be used.

The initial studies in man were concerned with the activity of brotizolam over the dose range 0.1 to at least 0.5 mg, and subsequent studies on sleep and on performance in healthy subjects have indicated that the most useful dose is likely to be around 0.25 mg. With 0.25 mg, brotizolam reduces sleep onset latency, increases total sleep time, improves the sleep efficiency index, reduces drowsy sleep and the number of awakenings. There is some delay to the first period of rapid eye movement sleep—as is seen with most, if not all, benzodiazepines—but this is without any reduction in the total amount of rapid eye movement sleep and there is no reduction in slow wave sleep.

With 0.25 mg there are no residual effects the next day, and there is no evidence of rebound insomnia on withdrawal after repeated ingestion. However, though with a higher dose (0.5 mg) the hypnotic effect may be more pronounced, there is reduced rapid eye movement and slow wave sleep, as well as residual effects the next day and the possibility in some individuals of rebound insomnia on withdrawal. It is therefore clear from studies in both healthy subjects and in insomniacs that the most appropriate dose of brotizolam is 0.25 mg. At this dose it is effective, free of adverse effects on the sleep process, without residual effects the next day and free of accumulation on repeated ingestion and of rebound phenomena on withdrawal.

Clinical studies have confirmed these findings. In a long-term study in hospitalized patients complaining of sleep disturbances four-fifths of the patients used 0.25 mg daily over several months, and there was no evidence of a trend towards an increase in dose. Some of the patients required only 0.125 mg. About one-

tenth needed 0.5 mg, and the use of a higher dose in some would have been expected in such patients.

The effectiveness of 0.25 mg in general practice has been confirmed in several trials. The need to use—at least initially—a lower dose in the elderly has also been found with brotizolam as about two-thirds of elderly patients are satisfied with 0.125 mg. Further, 0.25 mg brotizolam has equal efficacy as 2.0 mg flunitrazepam and 30 mg flurazepam hydrochloride, but has the added advantage that it is free of the adverse effects of these drugs in these doses on daytime wakefulness. There is one clinical situation when a higher dose range (0.25–0.5 mg) may be useful, and that is pre-operatively overnight.

In summary, the clinical profile of brotizolam is most promising. The dose range is 0.125–0.25 mg with the lower dose useful in some patients and especially so for the elderly. Within this dose range brotizolam is without adverse effects on the sleep process, free of residual effects the next day and free of accumulation. It is, therefore, indicated in the

management of transient insomnia for those who have to carry out skilled activity the next day and for those who may need medication nightly.

It is of interest that the rate of plasma decay of brotizolam lies in the middle of that of the rapidly eliminated drugs presently available or under development. Rapidly eliminated hypnotics with very short half-lives tend to have their activity restricted to the early part of the night, whereas those without a sustained distribution phase and longer elimination half-lives may have residual effects the next day in doses necessary to provide adequate hypnotic activity. Brotizolam with a half-life of around 5 h sits comfortably in the middle of the range of the rapidly eliminated drugs, and so holds promise in patients who have difficulty in maintaining sleep as well as those who have difficulty in falling asleep. The particular advantage of brotizolam is likely to be that effectiveness in maintaining sleep would be free of residual effects the next day and without accumulation on repeated ingestion.

ÜBERSICHT DER KUNISCHEN STUDIEN MIT BROTIZOLAM

A.N. NICHOLSON

Die Bewertung einer neuen Substanz wird bei der Entwicklung von Hypnotika vielleicht am kritischsten vorgenommen. In den zahlreichen Disziplinen der Pharmakokinetik und Pharmakodynamik wird heute sehr viel Fachwissen auf ihre Beurteilung verwendet. Viele meinen, daß wir bereits zu viele Hypnotika hätten, obwohl die Vorteile unterschiedlicher Substanzen zur Behandlung von Schlafstörungen oft nicht in vollem Umfang erkannt werden.

Die Unsicherheit hinsichtlich des Stellenwerts von Hypnotika bei der Behandlung von Schlafstörungen ist auch deshalb entstanden, weil über die Schlaflosigkeit selbst und ihre zahlreichen Manifestationen wenig Klarheit herrscht. Vorübergehende Schlaflosigkeit bei einem aktiven Menschen, der qualifizierte Arbeit leisten muß, stellt ein völlig anderes Problem dar als rezidivierende Schlaflosigkeit bei Patienten mit Angstzuständen. Da Hypnotika unterschiedliche Wirkprofile haben, ist es darüber hinaus wichtig, daß man sich über die Art der Schlafstörung im klaren ist, bevor solche Mittel angewandt werden.

Bei vorübergehender Schlaflosigkeit sollte man wissen, ob es sich um eine Einschlaf- oder Durchschlafstörung handelt. Zudem stellt sich die Frage, ob ein Medikament nur gelegentlich oder wiederholt gebraucht wird und ob die Arbeit am Tage die Vermeidung jeglicher sedativen Nachwirkung notwendig macht. Darüber hinaus stellen bei manchen Patienten Angstzustände das primär zu behandelnde Symptom dar. Alle diese Aspekte sind zu berücksichtigen, weil eine adäquate Behandlung vom jeweiligen klinischen Bild abhängt.

Bei der Anwendung von Hypnotika ist die Wirkungsdauer von besonderer Relevanz, und im Laufe der letzten Jahre hat unser Wissen um die Faktoren, die diese beeinflussen, erheblich zugenommen. Hypnotika mit langer, bis in den Tag hinein anhaltender Wirkungsdauer haben, obwohl sie bei täglicher Einnahme kumulieren, ihren Platz bei der Behandlung von Schlaflosigkeit, vor allem dann, wenn eine Angstkomponente hinzutritt. Andererseits herrscht in zunehmenden Maße Klarheit darüber, daß Hypnotika mit relativ rasch absinkender Plasmakonzentration aufgrund einer ausgeprägten Verteilungsphase oder rascher Elimination bei der Behandlung vorübergehender Schlaflosigkeit die Mittel der Wahl darstellen.

Zu den Substanzen, die rasch eliminiert werden—bisweilen als dritte Hypnotikageneration bezeichnet—zählt Brotizolam. Allerdings werden auch innerhalb dieser Gruppe die Plasmaspiegel der verschiedenen Substanzen unterschiedlich schnell

abgebaut, so daß sie die Schlafdauer in unterschiedlichem Maße beeinflussen können.

Und gerade im Hinblick auf die Schlaferhaltung während der Nacht ohne Nachwirkungen am folgenden Tag besitzt Brotizolam möglicherweise einen besonderen therapeutischen Stellenwert.

Brotizolam weist eine hohe Affinität zum Benzodiazepinrezeptor auf. Es ist ein potentes Hypnotikum, das weitestgehend resorbiert und zu hydroxylierten Verbindungen metabolisiert wird, die ihrerseits schnell ausgeschieden werden. Es hat keine lang wirkenden Metaboliten, und bei wiederholter Gabe besteht keine Tendenz zur Kumulation. Mit dem Radiorezeptorassay wurde eine Zerfallszeit des aktiven hypnotischen Wirkstoffs von etwa 5 Stunden bestimmt. Die Eliminationshalbwertszeit ist geringfügig länger bei alten Menschen; sie ist aber dennoch relativ kurz, so daß eine Kumulation bei täglicher Applikation unwahrscheinlich ist. Auch bei Niereninsuffizienz entsteht keine Kumulation, selbst dann nicht, wenn die Kreatinin-Clearance unter 15 mg min^{-1} liegt, so daß eine Dosisanpassung hier nicht erforderlich ist. Bei manchen Patienten mit Leberzirrhose hingegen kann es zu einer Verminderung der Clearance kommen, so daß hier niedriger dosiert werden sollte.

Die ersten Studien am Menschen befaßten sich mit der Wirkung von Brotizolam im Dosisbereich 0,1 bis mindestens 0,5 mg. Spätere Studien zu Schlaf und Leistungsfähigkeit bei gesunden Probanden zeigten, daß die geeignetste Dosis wahrscheinlich um 0,25 mg liegt. Eine Dosierung von 0,25 mg Brotizolam verkürzt die Einschlafzeit, verlängert die Gesamtschlafzeit, verbessert den Schlafindex, verringert das Schlafstadium 1 und die Aufwachhäufigkeit. Die erste REM-Schlafphase wird etwas verzögert, wie dies bei den meisten, wenn nicht bei allen Benzodiazepinen festzustellen ist, doch kommt es dabei weder zu einer Verminderung des Gesamt-REM-Schlafs noch des Deltawellenschlafs.

Bei 0,25 mg lassen sich weder Hangover-Effekte am folgenden Tag feststellen, noch bestehen Hinweise auf einen Rebound nach wiederholter Einnahme. Wenn auch bei einer höheren Dosierung (0,5 mg) die hypnotische Wirkung ausgeprägter sein kann, werden jedoch REM- und Deltawellenschlaf verkürzt, sind Nachwirkungen am folgenden Tag vorhanden, und es besteht bei manchen Individuen die Möglichkeit eines Rebound nach Absetzen der Substanz.

Aus Studien sowohl an gesunden als auch an schlafgestörten Probanden ging hervor, daß Brotizolam in

einer Dosierung von 0,25 mg am geeignetsten ist. In dieser Dosierung ist es wirksam, frei von Nebenwirkungen auf den Schlafverlauf, ohne Nachwirkungen am folgenden Tag und frei von Kumulation nach wiederholter Einnahme sowie ohne Rebound-Phänomene nach dem Absetzen.

Klinische Studien bestätigten diese Befunde. In einer Langzeitstudie an hospitalisierten Patienten, die über Schlafstörungen klagten, nahmen vier Fünftel der Patienten mehrere Monate lang täglich 0,25 mg ohne Neigung zu einer Dosissteigerung ein. Einige kamen mit nur 0,125 mg aus, während etwa ein Zehntel 0,5 mg benötigte; die Einnahme einer höheren Dosis war jedoch bei einigen dieser Patienten zu erwarten gewesen.

Die Wirksamkeit von 0,25 mg in der Allgemeinpraxis wurde in mehreren Prüfungen bestätigt. Die Notwendigkeit, bei älteren Patienten zumindest zu Behandlungsbeginn niedriger zu dosieren, wurde auch mit Brotizolam festgestellt; etwa zwei Drittel der älteren Patienten kommen mit 0,125 mg aus. 0,25 mg Brotizolam zeigen die gleiche Wirksamkeit wie 2,0 mg Flunitrazepam und 30 mg Flurazepamhydrochlorid, ohne jedoch die Nebenwirkungen dieser Substanzen in der genannten Dosierung auf die Befindlichkeit am Tage hervorzurufen. Allerdings gibt es eine klinische Situation, in der ein höherer Dosisbereich (0,25–0,5 mg) von Nutzen sein kann, und zwar in der Nacht von einer Operation.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das klinische Profil von Brotizolam überaus vielversprechend ist. Der Dosisbereich liegt zwischen 0,125

und 0,25 mg, wobei die niedrigere Dosierung bei einigen, vor allem bei älteren Patienten von Nutzen ist. In diesem Dosisbereich zeigt Brotizolam weder Nebenwirkungen auf den Schlafverlauf noch solche am folgenden Tag und auch keine Kumulation. Es ist daher angezeigt, für die Behandlung vorübergehender Schlaflosigkeit sowohl bei Menschen, die am nächsten Tag qualifizierte Arbeit leisten müssen wie auch bei Patienten, die jede Nacht einer Medikation bedürfen.

Interessant ist, daß die Zerfallsgeschwindigkeit von Brotizolam im Plasma etwa im mittleren Bereich der rasch ausgeschiedenen Substanzen liegt, die zur Zeit erhältlich sind oder sich noch in der Entwicklung befinden. Bei rasch eliminierten Hypnotika mit sehr kurzen Halbwertszeiten ist die Wirksamkeit meist auf den frühen Teil der Nacht beschränkt, wohingegen Hypnotika ohne ausgeprägte Verteilungsphase und mit längeren Eliminationshalbwertszeiten in den für eine adäquate hypnotische Wirkung erforderlichen Dosen Überhangseffekte am nächsten Tag haben können. Brotizolam mit einer Halbwertszeit von etwa 5 Stunden befindet sich im mittleren Bereich der schnell eliminierten Substanzen und ist somit geeignet sowohl für Patienten mit Durchschlafstörungen als auch für Patienten mit Einschlafstörungen. Der besondere Vorteil von Brotizolam liegt wahrscheinlich in seiner durchschlaffördernden Wirkung, ohne daß Nachwirkungen am folgenden Tag auftreten und ohne daß es bei wiederholter Einnahme zur Kumulation kommt.

BROTIZOLAM: TABLEAU D'ENSEMBLE DES ETUDES CLINIQUE

A.N. NICHOLSON

C'est, peut-être, dans le développement des hypnotiques que l'on rencontre les appréciations les plus critiques sur les nouveaux médicaments. Une somme considérable d'expertises provenant de nombreuses disciplines de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie sont aujourd'hui réalisées pour étayer solidement les fondements de ces appréciations. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il y en a trop déjà en dépit du fait que, souvent, l'avantage de diverses drogues dans le traitement de l'insomnie n'est pas suffisamment reconnu.

L'incertitude relative à la place des hypnotiques dans le traitement des troubles du sommeil s'est également accrue du fait que l'on ne comprend guère l'insomnie elle-même ni ses nombreuses manifestations. L'insomnie passagère d'une personne active plongée dans un travail requérant une compétence professionnelle particulière est un problème très différent de celui posé par l'insomnie des patients souffrant d'anxiété. Et, comme les hypnotiques présentent des profils différents, il est important que la nature du trouble du sommeil soit connue avant d'appliquer de tels remèdes.

Il est nécessaire, lorsque l'on se trouve confronté à l'insomnie passagère, d'élucider d'abord si les troubles du sommeil consistent en de la difficulté à s'endormir ou à rester endormi. Il faut également savoir si le médicament doit être appliqué occasionnellement ou d'une manière répétée, et si la nature du travail journalier du patient est telle qu'un effet sédatif résiduel doit être évité. En outre, chez certains patients, l'anxiété peut être d'importance primordiale. Tous ces aspects doivent être considérés car un traitement approprié dépend du tableau clinique en présence.

La durée de l'action des hypnotiques revêt un intérêt particulier pour leur application. Les facteurs influant sur la durée de leur action sont devenus de plus en plus clairs au cours de ces dernières années. Les hypnotiques dont l'activité persiste une grande partie du jour suivant entrent également en ligne de compte dans le traitement de l'insomnie—en particulier en présence d'anxiété—même si une accumulation due à la prise journalière est vraisemblable, et l'on accepte aujourd'hui de plus en plus l'idée que les hypnotiques présentant une chute relativement rapide du taux plasmatique due soit à une phase de distribution soutenue ou à une rapide élimination conviennent au traitement de l'insomnie passagère.

Les substances d'élimination rapide—appelées

quelquefois la troisième génération d'hypnotiques—comprennent également le brotizolam. Cependant, même au sein de ce groupe, les diverses préparations comportent des vitesses différentes de baisse du taux plasmatique et assurent, donc, le sommeil à des degrés variés. C'est dans le contexte d'un sommeil soutenu pendant la nuit, mais dans effets résiduels le jour suivant, que le brotizolam peut occuper une place particulière en thérapeutique.

L'affinité du brotizolam pour le récepteur des benzodiazépines est très élevée. C'est un hypnotique puissant très largement absorbé et métabolisé en composés hydroxylés qui sont rapidement éliminés. Il est exempt de métabolites d'action prolongée, et un traitement multidoses n'entraîne pas de tendance à l'accumulation. Le test de récepteur radio montre que la dégradation du principe hypnotique actif est d'environ 5 heures. La demi-vie d'élimination est un peu plus longue chez les personnes âgées, mais reste, cependant, relativement rapide, de sorte qu'il est peu probable qu'une application quotidienne amène une accumulation. Il n'y a également pas d'accumulation dans le cas d'insuffisance rénale, même si les clairances de créatinine sont inférieures à 15 mg min^{-1} , il n'est pas donc nécessaire d'ajuster la dose de brotizolam lorsqu'il est administré en présence d'insuffisance rénale. Cependant, il peut arriver que la clairance diminue chez quelques patients atteints de cirrhose; on emploiera alors des doses plus faibles.

Les premières études sur l'homme ont porté sur l'activité du brotizolam à des doses entre 0,1 et, au moins, 0,5 mg. Les études suivantes sur le sommeil et les performances chez des sujets en bonne santé ont montré que la dose la plus appropriée semble graviter autour de 0,25 mg. A cette dose, le brotizolam réduit le temps de latence avant l'arrivée du sommeil, augmente la durée totale du sommeil, améliore l'indice d'efficacité du sommeil et réduit le demi-sommeil ainsi que le nombre d'éveils nocturnes. On constate un certain retard avant le début de la première période MOR, ce qui est le cas pour la plupart, si non toutes, les benzodiazépines, mais ceci ne se traduit pas par une réduction de la somme totale du sommeil MOR ni par celle du sommeil à ondes lentes. La dose de 0,25 mg ne suscite pas d'effets résiduels le jour suivant, et rien n'indique que l'arrêt de l'administration après une prise répétée entraîne une insomnie rebound. Cependant, quoique à une dose plus élevée (0,5 mg), l'effet hypnotique peut être plus prononcé, cela s'accompagne d'une réduction du sommeil MOR

de celui à ondes lentes, d'effets résiduels le jour suivant et, éventuellement, chez quelques individus, d'insomnie rebound à l'arrêt de l'administration. Il ressort donc clairement des études réalisées à la fois sur des sujets sains et des insomniaques que la dose de brotizolam convenant le mieux est celle de 0,25 mg. Le brotizolam est, à cette dose, efficace, n'exerce pas d'effets négatifs sur les diverses phases du sommeil, n'entraîne pas d'effets résiduels le jour suivant, est exempt d'accumulation lors de prise répétée et ne suscite pas d'effet rebound à l'arrêt de son application.

Les études cliniques ont confirmé ces résultats. Dans une étude à long term réalisée sur des patients hospitalisés se plaignant de troubles du sommeil, les quatre cinquièmes de ces patients ont pris 0,25 mg quotidiennement pendant plusieurs mois sans qu'il n'y ait eu aucune indication d'une tendance vers une augmentation de la dose. Certains des patients n'ont nécessité que 0,125 mg. Environ un dixième a dû prendre 0,5 mg, et la prise d'une dose plus élevée pouvait être escomptée pour de tels patients.

L'efficacité de la dose de 0,25 mg en pratique générale a été confirmée par plusieurs essais. L'application d'une dose inférieure—du moins initialement—s'est révélée appropriée chez les patients âgés. En effet, environ les deux tiers de ces patients n'ont nécessité qu'une dose de 0,125 mg. Les essais ont montré également qu'une dose de 0,25 mg de brotizolam présente la même efficacité que 2,0 mg de flunitrazépam et que 30 mg de chlorhydrate de flurazépam tout en possédant l'avantage supplémentaire d'être exempt des effets négatifs qu'exercent à ces doses de telles préparations sur l'état vigile pendant la journée. Une marge posologique plus élevée

(0,25–0,5 mg) peut se justifier pour la nuit précédant une opération.

En résumé, le profil clinique du brotizolam est très prometteur. La marge posologique est de 0,125 à 0,25 mg, la dose inférieure étant efficace chez certains patients, en particulier les personnes âgées. Dans cette zone, le brotizolam n'exerce pas d'effets négatifs sur les diverses phases du sommeil, est exempt d'action résiduelle le jour suivant et ne s'accumule pas. Il est, donc, indiqué dans le traitement de l'insomnie passagère pour les sujets devant exercer le jour suivant une activité nécessitant toutes leurs facultés intellectuelles et pour ceux devant être soumis à une médication quotidienne.

Il est intéressant de noter que la vitesse de dégradation plasmatique du brotizolam se trouve dans la moyenne de celle des substances rapidement éliminées actuellement disponibles ou en cours de mise au point. En effet, les hypnotiques rapidement éliminés et de demi-vie très brève ont tendance à n'exercer leur action que dans la première partie de la nuit, tandis que celles sans phase de distribution soutenue et de demi-vie d'élimination plus prolongée peuvent exercer des effets résiduels le jour suivant lorsqu'elles sont administrées aux doses nécessaires pour obtenir une action hypnotique adéquate. Le brotizolam, dont la demi-vie est d'environ 5 heures, occupe une place confortable au centre de la plage des préparations d'élimination rapide, pouvant ainsi aider tant les patients ayant des difficultés à rester endormis que ceux s'endormant difficilement. L'avantage particulier du brotizolam réside probablement en ce qu'il maintient efficacement le sommeil tout en ne présentant pas d'effets résiduels le jour suivant ni d'accumulation lors d'administration répétée.

BROTIZOLAM: REVISION DE LOS ESTUDIOS CLINICOS

A. N. NICHOLSON

Quizás sea en el desarrollo de los hipnóticos donde deba afrontarse la valoración más crítica de un nuevo fármaco. Considerable pericia se mancomuna hoy en día en su valoración, procedente de diversas disciplinas dentro del campo de la farmacocinética y farmacodinámica. Muchos creen que ya hay demasiados, si bien a veces no se aprecia del todo la ventaja de distintos fármacos en el tratamiento del insomnio.

Al ser escasos los conocimientos sobre el propio insomnio y sus múltiples manifestaciones, se ha suscitado una cierta incertidumbre respecto al lugar que los hipnóticos ocupan en el tratamiento de las dificultades del sueño. El insomnio pasajero en un individuo que realiza un trabajo cualificado plantea un problema muy distinto al del insomnio recurrente en pacientes con ansiedad. Por otra parte, como los hipnóticos presentan distintos perfiles es importante conocer la naturaleza del trastorno del sueño antes de utilizar tales fármacos.

Por lo que respecta al insomnio pasajero es necesario decidir si el trastorno se refiere a una dificultad en conciliar o en mantener el sueño. También es preciso responder a la pregunta de si un fármaco se va a utilizar sólo de forma ocasional o si va a necesitarse repetidamente y si el tipo de trabajo diurno es tal que debe evitarse cualquier efecto sedante residual. Por lo demás, en algunos pacientes la ansiedad puede constituir el síntoma primario. Todos estos aspectos deben ser tenidos en cuenta ya que un manejo adecuado depende del cuadro clínico.

La duración del efecto revista especial importancia con respecto al uso de los hipnóticos; en estos últimos años se han ido conociendo mejor los factores que influyen sobre la misma. Los hipnóticos con actividad persistente que se mantiene hasta el día siguiente tienen su lugar en el tratamiento del insomnio —especialmente cuando existe un componente de ansiedad—aunque sea probable que se produzca un acúmulo con la ingestión diaria. Pero cada vez se va tomando más conciencia de que hipnóticos con un descenso relativamente rápido del nivel en plasma, ya sea debido a una fase de distribución sostenida o a su rápida eliminación, son los adecuados para el tratamiento del insomnio pasajero.

Brotizolam se cuenta entre los fármacos que se eliminan rápidamente—se habla a veces de la tercera generación de hipnóticos. No obstante, incluso dentro de este grupo, los diversos fármacos presentan distintos tipos de declinación de los niveles en plasma y así pueden mantener el sueño en grado variable. Es dentro del contexto del sueño en grado variable. Es

dentro del contexto del sueño sostenido durante la noche, sin efectos residuales al día siguiente, que brotizolam puede ocupar un lugar particular en el campo terapéutico.

Brotizolam posee una elevada afinidad hacia el receptor benzodiazepínico. Es un hipnótico potente que se absorbe de forma amplia y se metaboliza en compuestos hidroxilados, que se eliminan con rapidez. Carece de metabolitos de acción prolongada y en caso de tratamiento con dosis múltiples no existe tendencia a la acumulación. Con el uso del "radio-receptor-assay" la declinación del principio hipnótico activo se estima en alrededor de 5 horas. La vida media de eliminación es ligeramente más prolongada en los ancianos, pero es todavía relativamente breve, por lo que resulta improbable la acumulación con su uso diario. Tampoco se produce acumulación en caso de insuficiencia renal, ni siquiera con una depuración de creatinina inferior a 15 mg min^{-1} , y por consiguiente no se requiere una adaptación especial de la dosis cuando brotizolam se utiliza en tales pacientes. Sin embargo, en algunos enfermos con cirrosis puede disminuir la depuración plasmática, debiendo utilizarse entonces dosis inferiores.

Los estudios iniciales realizados en el ser humano se centraron en la actividad de brotizolam dentro de límites de dosis de 0,1 hasta por lo menos 0,5 mg. Estudios posteriores sobre el sueño y el rendimiento en individuos sanos han puesto de relieve que, con toda probabilidad, la dosis más útil se situaría en torno a los 0,25 mg. Con dosis de 0,25 mg, brotizolam reduce el período de latencia del sueño, aumenta el tiempo de sueño total, mejora el índice de eficiencia del sueño, reduce el sueño amodorrado y el número de despertares. Se produce cierto retraso en el primer período de sueño REM, tal como se observa con la mayoría si no con todas las benzodiazepinas, pero sin reducción de la cantidad total de sueño REM ni del sueño de onda lenta. Con 0,25 mg no se advierten efectos residuales al día siguiente y no existe tampoco evidencia de insomnio rebote al interrumpir la medicación después de ingestión repetida. No obstante, si bien con una dosis superior (0,5 mg) el efecto hipnótico puede ser más pronunciado, se produce una disminución del sueño REM y de onda lenta, así como se advierten también efectos residuales al día siguiente, con la posibilidad de que en algunos individuos se origine un insomnio rebote al proceder a la interrupción del fármaco. Así pues, tanto los estudios realizados en individuos sanos como en pacientes con insomnio denotan que la dosis

más adecuada de brotizolam es 0,25 mg. Con esta dosis el fármaco es eficaz, carece de efectos desfavorables sobre el proceso del sueño y de efectos residuales al día siguiente y no se produce tampoco una acumulación con la ingestión repetida ni fenómenos de rebote al interrumpir la medicación.

Estudios clínicos han confirmado estos hallazgos. En un estudio a largo plazo en pacientes hospitalizados afectos de trastornos del sueño, cuatro quintos de los pacientes utilizaron 0,25 mg diariamente durante varios meses, sin que se evidenciara una tendencia a incrementar la dosis. Algunos pacientes requirieron solamente 0,125 mg. Alrededor del 10% requirió una dosis de 0,5 mg habiendo cabido esperar el uso de dosis superiores por algunos de tales pacientes.

La eficacia de 0,25 mg en la práctica médica general se ha visto confirmada en diversos ensayos. Se ha comprobado también la necesidad de utilizar—por lo menos al principio—una dosis inferior en los ancianos, ya que en alrededor de los dos tercios de los mismos 0,125 mg resultan suficientes. Por otra parte 0,25 mg de brotizolam despliegan la misma eficacia que 2,0 mg de flunitrazepam y 30 mg de clorhidrato de flurazepam, pero con la ventaja sobreañadida de la ausencia de los efectos desfavorables de dichos fármacos sobre la vigilia diurna cuando se administran a las dosis mencionadas. Existe una situación clínica en la que sí puede ser útil un margen de dosis superior (0,25–0,5 mg): la noche previa a una intervención quirúrgica.

En resumen, el perfil clínico de brotizolam es sumamente prometedor. Los límites de dosis son 0,125–0,25 mg siendo la dosis inferior suficiente para

algunos pacientes, sobre todo los ancianos. Dentro de estos límites de dosis brotizolam carece de efectos desfavorables sobre el proceso del sueño, de efectos residuales al día siguiente y no se corre el riesgo de acumulación. Así pues, resulta indicado para el tratamiento del insomnio pasajero en aquellos individuos que deben realizar una actividad cualificada la jornada siguiente y para aquéllos que requieran de medicación cotidiana.

Resulta interesante el hecho de que el índice de declinación en plasma de brotizolam se encuentre en el centro respecto de los fármacos de eliminación rápida actualmente disponibles o en fase de desarrollo. Los hipnóticos de eliminación rápida con vida media muy breve tienden a limitar su actividad a la primera parte de la noche, mientras que aquéllos sin fase de distribución sostenida o con vida media de eliminación más prolongada pueden dar lugar a efectos residuales al día siguiente cuando se los administra en las dosis necesarias para conseguir una adecuada actividad hipnótica. Brotizolam, con una vida media de alrededor de 5 horas, se sitúa cómodamente en el medio de los fármacos de eliminación rápida, y por ello resulta promisorio para pacientes con dificultades en mantener el sueño, así como para aquéllos que tienen dificultades para conciliarlo. Probablemente la ventaja especial de brotizolam estriba en el hecho de que su eficacia para mantener el sueño, se ve exenta de efectos residuales al día siguiente y sin peligro de acumulación en caso de ingestión repetida.