W. Seeger

Medizinische Klinik II, Klinikum der Justus-Liebig-Universität Gießen

Pneumologie

Zum Thema

Lungenerkrankungen stehen mit 10% in der Mortalitätsstatistik an 3. Stelle und machen 15% aller Arbeitsunfähigkeitsfälle aus; 40% aller Todesfälle auf Intensivstationen sind pulmonaler Genese. Als Todesursache infektiöser Krankheiten führen Pneumonien weltweit, die Tuberkulose steht an 5. Stelle. Diese Zahlen sprechen für sich und unterstreichen die Bedeutung der Pneumologie als wichtiges Teilgebiet der Inneren Medizin, eng verzahnt mit den anderen Teilgebieten. Bahnbrechende Fortschritte konnten in den letzten Jahren bezüglich der Ursachen, der Pathogenese, Diagnostik und Therapie von Lungenerkrankungen gemacht werden. So kann die vorliegende Arbeit trotz ihres Umfangs nur eine tour d'horizon über die Techniken und diagnostischen sowie therapeutischen Möglichkeiten der Pneumologie sein. Anhand der wichtigsten Krankheitsbilder werden in aller Kürze die neuesten Perspektiven des Fachgebiets aufgezeigt. Die Pneumologie hat leider hierzulande Strukturprobleme. Im Gegensatz zu den USA und anderen westeuropäischen Universitäten ist sie deutlich unterrepräsentiert, so daß eigenständige Abteilungen gegenwärtig nur an wenigen deutschen Universitäten bestehen. Es wird angestrebt, nicht zuletzt mit Unterstützung des Wissenschaftsrats, dies zu ändern.

Schlüsselwörter

Pneumologie, Bestandsaufnahme · Asthma bronchiale · Bronchitis · Mukoviszidose · Pneumonie · Bronchialkarzinom · Cor pulmonale · Schallbezogene Atemstörungen

Die Pneumologie repräsentiert einen Schwerpunkt der Inneren Medizin mit großer sozioökonomischer Bedeutung. International hat dieses Fach in den letzten Jahrzehnten eine rasante Entwicklung von der klassischen Phthisiologie über eine vorwiegend an der Lungenfunktion ausgerichtete Disziplin zu einem internistischen Fach mit zunehmender Bedeutung biochemischer, zellbiologischer und molekularbiologischer Techniken genommen. Komplett neue Tätigkeitsbereiche haben den Fokus der Pneumologie erheblich erweitert, wie z.B. die Schlafmedizin, die Lavage-Analytik unter Nutzung biochemischer und (immun)-zytologischer Techniken, die molekulargenetische Analytik am Beispiel der Mukoviszidose und des α_1 -Protease-Inhibitor-Mangels, die pneumologische Intensivmedizin inklusive invasiver und non-invasiver Beatmungstechniken, die Heimbeatmung bei chronischer respiratorischer Insuffizienz, die Nutzung der Aerosoltechnologie für topische Therapieformen der Lunge, selektive Vasomodulation bei pulmonaler Hypertonie, die Versorgung von erwachsenen Mukoviszidose-Patienten und die zunehmende Einbeziehung umweltmedizinischer Aspekte.

Das Methodenspektrum der Pneumologie ist dementsprechend sehr weit gefaßt. Dem steht in Deutschland ein gravierendes strukturelles Defizit durch mangelnde Repräsentanz der Pneumologie an den Universitätskliniken und den großen städtischen Kliniken gegenüber. Die zukünftige Entwicklung der Pneumologie wird sowohl

bei den großen Volkskrankheiten (Asthma bronchiale, akute und chronische Bronchitis, Lungenemphysem, Pneumonien, Bronchialkarzinom, Schlafapnoe, Lungenfibrosen) wie auch bei der großen Palette seltenerer Erkrankungen der Atmungsorgane das apparativ-funktionelle Diagnostik- und Therapie-Spektrum zunehmend um ein Spektrum selektiver pharmakologischer und molekularbiologischer Interventionen vor dem Hintergrund eines besseren Verständnisses der zellbiologischen und molekularen pathogenetischen Abläufe erweitern.

Allgemeine Aspekte

Zum Inhalt des Schwerpunktes

Erkrankungen der Atmungsorgane umfassen ein sehr weitgefächertes Spektrum von Gesundheitsstörungen innerhalb der Inneren Medizin. So zählen Asthma bronchiale, akute und chronische Bronchitis und das Lungenemphysem zu den bekannten großen Volkskrankheiten. Bei den Männern ist das Bronchialkarzinom mit Abstand der häufigste zum Tode führende Krebs, bei Frauen nimmt diese Tumorerkrankung die zweite Position ein, mit steigender Tendenz. Pneumonien stehen weltweit an der Spitze der zum Tode führenden Infektionskrankheiten. Die Tuberkulose nimmt in dieser Skala die 5. Position

Prof. Dr. W. Seeger
Medizinische Klinik II, Klinikum der
Justus-Liebig-Universität, Klinikstraße 36,
D-35392 Gießen

Abb. 1 ▲ Arbeitsunfähigkeit nach Krankheitsgruppen [1, 2]

ein, mit einem Reservoir von ca. 1/3 der Weltbevölkerung, das an *Mycobacterium tuberculosis* infiziert ist. Ca. 40% aller Todesfälle auf den Intensivstationen sind pulmonaler Genese, mit akutem Lungenversagen (ARDS, Pneumonie) und pneumogener Sepsis als führenden Diagnosen. Lungenembolien und andere Formen der akuten und chronischen pulmonalen Hypertonie mit konsekutivem Cor pulmonale tragen wesentlich zu der Todesfallstatistik durch (Rechts)-Herzversagen bei.

Bei den schlafbezogenen Atemstörungen, die mit einer signifikanten Übersterblichkeit verbunden sind, ist von einer Prävalenz von 2–4% der Bevölkerung auszugehen. Interstitielle Lungenerkrankungen mit dem Endstadium der Fibrose können durch eine Vielzahl unterschiedlichster Ätiologien provoziert werden, mit einem dementsprechend hohen Anspruch an das diagnostische und therapeutische Procedere. Die Mukoviszidose ist die häufigste angeborene zum Tode führende Stoffwechselerkrankung, wobei die Betroffenen heute in den allermeisten Fällen das Erwachsenenalter erreichen. Pulmonale Erkrankungen machen mehr als ein Drittel aller entschädigten Berufserkrankungen aus, wobei neben Silikose und Asbestose andere Stäube und organische Materialien zunehmend in den Vordergrund treten. Eine Vielzahl weiterer seltenerer Erkran-

kungen komplettiert das komplexe Arbeitsfeld der Pneumologie.

In Analogie zu der breiten Fächerung pneumologischer Erkrankungen weist dieses Fach eine Methodenvielfalt auf diagnostischem und therapeutischen Gebiet wie kaum ein anderer Schwerpunkt der Inneren Medizin auf. Als wesentlich zu nennen sind:

- Funktionsuntersuchungen der Ventilation, des Gasaustausches und der kardiopulmonalen Interaktion
- Endoskopische Verfahren (Bronchoskopie und Thorakoskopie; diagnostische und therapeutische Eingriffe)
- Kathetertechniken (pulmonale und bronchiale Zirkulation)
- Allergologische Tests und Therapieverfahren
- Schlaflabor (Analyse und Behandlung von schlafbezogenen Atemstörungen)
- Maschinelle Beatmung und intensivmedizinische Techniken
- Non-invasive (Heim)-Beatmung
- Tumor-Staging und Durchführung komplexer Tumotherapien
- Bildgebende Verfahren (Sonographie, Röntgen, CT, MRT, Szintigraphie, PET)
- Laboruntersuchungen (Zytologie und Biochemie der Lavage; zunehmend molekulare Analysen)
- Analyse umwelt- und arbeitsmedizinischer Aspekte

- Verfahren der pneumologischen Rehabilitation

Vor diesem Hintergrund verwundert nicht die sozioökonomische Bedeutung, die pneumologischen Erkrankungen zukommt. Gerechnet über alle auch nicht-internalistische Diagnosen sind ca. 15% aller Arbeitsunfähigkeitsfälle auf Erkrankungen der Atmungsorgane zurückzuführen (Abb. 1) [1, 2]. Nach Erkrankungen des Herzens und bösartigen Neubildungen nehmen laut Angabe des statistischen Bundesamtes Lungenerkrankungen mit ca. 10% aller Todesursachen die dritte Position der Mortalitätsstatistik ein, wobei unberücksichtigt blieb, daß das Rechtsherzversagen innerhalb der Gruppe des „Herztodes“ wesentlich Folge pulmonaler Erkrankungen ist, der Einfluß der schlafbezogenen Atemstörungen auf die Todesfallrate nur völlig unzureichend erfaßt ist und innerhalb der bösartigen Tumoren das quantitativ bedeutsame Bronchialkarzinom subsummiert wurde. Lungenerkrankungen verursachen vor Herz-Kreislaufenerkrankungen und bösartigen Tumoren die höchsten direkten und indirekten Gesundheitskosten überhaupt (Abb. 2) [1, 2].

Strukturelle Probleme

In vielfachen vorausgehenden Stellungnahmen der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie ist dargelegt worden, daß in Diskrepanz zu der Häufigkeit und gesundheitsökonomischen Bedeutung pneumologischer Erkrankungen eine gravierende Unterrepräsentanz des Schwerpunktes in den Medizinischen Fakultäten der deutschen Universitäten und den großen städtischen Kliniken besteht [2, 3]. Als beeindruckender Beleg dafür seien an dieser Stelle nur die Zahlen zur universitären Präsenz genannt. Während an allen amerikanischen Universitätskliniken eine selbstständige Abteilung für „Pulmonary and Critical Care Medicine“ vertreten ist (100%), die jeweils eine der größten Abteilungen in der Inneren Medizin darstellt, ist dieses im Durchschnitt der westeuropäischen Universitäten zu 82% der Fall, wohingegen eine eigenständige Abteilung mit pneumologischem Schwerpunkt in Deutschland nur an 24% der Universitätskliniken besteht (Abb. 3).

Abb. 2 ▲ Vergleich der direkten und indirekten Kosten für die drei „teuersten“ Erkrankungen (1992. Quelle: BMG, Statistisches Bundesamt)

Direkte Kosten: Ärztliche Leistungen, Arzneimittel, stationäre Behandlungen, Rehabilitation, Krankengeld

Indirekte Kosten: Arbeitsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, vorzeitige Todesfälle

Eine solche krasse Untervertretung wirkt sich notwendigerweise auf die Qualität der studentischen Ausbildung in den Inhalten dieses Schwerpunktes, auf die Qualität der Patientenversorgung, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung neuer diagnostischer und therapeutischer Standards, sowie auf die Breite und Qualität von klinischer Forschung und Grundlagenforschung mit pneumologischer Ausrichtung aus. So ist es bezeichnend, daß seit der Einrichtung des besonders hochrangig ausgewiesenen Förderinstrumentes der „Sonderforschungsbereiche“ (SFB) durch die DFG erst eine einzige SFB Gründung mit pneumologischem Schwerpunkt an einer deutschen Universitätsklinik gelang. Wichtigstes strukturelles Ziel der Pneumologie muß es somit sein, den Circulus vitiosus aus fehlender Repräsentanz an den großen klinischen Einrichtungen und unzureichendem Forschungsimpetus auf diesem wichtigen Gebiet zu durchbrechen, eine Entwicklung, die notwendigerweise von den Universitäten ihren Ausgangspunkt nehmen muß. Es ist beklagenswert, daß entsprechende Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur universitären Entwicklung der Pneumologie bislang nur völlig unzureichend umgesetzt wurden.

Diagnostische und therapeutische Perspektiven

Der Tatbestand, daß in gegenläufiger Tendenz zu vielen anderen internistischen Krankheitsgruppen in den nächsten 10–15 Jahren von einer Zunahme

pneumologischer Erkrankungen um über 20% auszugehen ist (Asthma, Bronchitis, Pneumonie, Bronchialkarzinom; [2]), macht die Weiterentwicklung diagnostischer und therapeutischer Verfahren in der Pneumologie besonders vorrangig. Folgende Entwicklungslinien stehen hierbei im Vordergrund:

Physikalisch-apparative Techniken

Die Atemmechanik (Gasfluß und Verteilung) und die Mechanik des pulmonalen Blutflusses stellen die physikalische Basis des pulmonalen Gasaustausches dar. Die funktionellen Untersuchungen dieser Prozesse werden weiter optimiert werden, insbesondere kann jedoch die Fortentwicklung technologischer Ansätze zur Beseitigung und/ oder Überbrückung atemgas- oder blutflußmechanischer Störungen erwartet werden. Zu nennen sind z.B. die non-invasiven Techniken zur Augmentierung defizitärer Spontanatmung, die Aerosoltechno-

logie, technologische Entwicklungen zur Offenhaltung (patency) von Atemwegen, ggf. technische Hilfsmittel zu Augmentierung und gesteuerten Verteilung des pulmonalen Blutflusses.

Biochemisch-pharmakologische Ansätze

Durch das Vorhandensein eines transbronchialen (endoskopische Techniken mit Lavage; Exhalat-Analyse) sowie eines transvasalen Zugangs (prä-postpulmonale Blutentnahmen) ist die Basis gegeben, mittels verbesserter biochemischer Analysetechniken genauere Kenntnisse des Ist-Zustandes von Stoffwechsel- und zellregulatorischen Prozessen der Lunge zu erlangen. Ebenso stehen beide „Zugangswege“ für die pharmakologische Beeinflussung der Lunge zur Verfügung. Es kann vorausgesagt werden, daß die Aerosoltechnologie mit gezielter Deposition von Pharmaka nicht nur zur therapeutischen Beeinflussung von bronchialen Prozessen sondern auch von Prozessen im interstitiellen und im intravasalen Kompartiment der Lunge zunehmend Verwendung finden wird. Ein Beweis dafür gelang kürzlich mit der selektiven pulmonalen Vasodilatation mittels Aerosolierung von vasorelaxierenden Prostanoiden [4, 5]. Darüber hinaus eröffnet sich bei Optimierung dieses Zuganges die Perspektive der transpulmonalen Pharmakonapplikation als neuer Weg zur systemischen Therapieführung (z.B. Inhalation von Insulin).

Molekularbiologische Ansätze

Molekularbiologische Analysen werden wie in vielen anderen Bereichen der

Abb. 3 ▲ Anteil selbständiger pneumologischer Abteilungen an Medizinischen Hochschulen/Universitäten [2]

Medizin zunehmend das diagnostische Handwerkszeug der Pneumologie komplettieren. Die Kenntnis der molekulargenetischen Prädisposition für pulmonale Erkrankungen, klassisch demonstriert für den Gendefekt der Mukoviszidose [6], wird auch ätiologisch komplexere Erkrankungen einbeziehen. Zudem wird die Analyse der transkriptionellen Regulation das Verständnis pathologischer pulmonaler Prozesse erweitern. Hier bietet die Lunge durch den leichten Zugang zur Zellgewinnung (Lavage, transbronchiale Biopsie) einerseits Chancen, andererseits ist die Analyse auf zellulärer Ebene durch die Komplexität der pulmonalen Architektur (mehr als 40 Zellpopulationen!) besonders anspruchsvoll. Hier auf zielen die Lösungsansätze, wie in-situ Hybridisierung, in-situ PCR und Laser-assisted Cell Picking mit quantitativer RT-PCR auf Einzellzebene [7], werden zunehmend Verwendung finden.

Nahezu einzigartig ist die Chance, den transbronchialen Zugang zur Lunge für molekularbiologische Therapieansätze zu nutzen. Eine Vorreiterrolle spielt wiederum die Therapie des Gendefekts der Mukoviszidose in den bronchialen Zellen [8]; prinzipiell ist jedoch eine gezielte Beeinflussung pathologischer Abläufe auf molekularer Ebene bei einer Vielzahl pulmonaler Erkrankungen denkbar. Für die Entwicklung geeigneter Applikationstechnologien (Aerosolierung von viralen, liposomalen usw. Vektoren) wird der Lunge eine entscheidende Rolle zukommen, die – wie bereits für die pharmakologische Entwicklung skizziert – auch für transpulmonale Therapiestrategien (Beeinflussung systemischer Prozesse) genutzt werden kann.

Mikrobiologische Analytik und Therapieführung

Nachweisverfahren infektiöser Erreger (Bakterien, Viren, Pilze, Protozoen) aus unterschiedlichen Specimen (Sputum, exhalierendes Kondensat, Bürstenabstrich, Lavage, Biopsien) werden durch zunehmende Etablierung molekularbiologischer Analytik optimiert werden. Auch Aussagen zur Sensitivität der Erreger gegenüber Chemotherapeutika, in Ergänzung der üblichen Verfahren der Anzüchtung und Resistenzprüfung, sind auf der Basis der genomischen Analyse der Erreger denkbar.

Bildgebende Verfahren

Neben der klassischen Darstellung morphologischer Strukturen wird die bildgebende Funktions- und Stoffwechsel-Diagnostik treten. Darstellungen biochemischer Reaktionsabläufe vor morphologischem Hintergrund können zur Charakterisierung inflammatorischer, reparativer und neoplastischer Prozesse und zu ihrer Unterscheidung wesentlich beitragen.

Spezielle Aspekte wesentlicher pneumologischer Erkrankungen

An dieser Stelle sollen bedeutsame Entwicklungsperspektiven wichtiger Volkskrankheiten innerhalb der Pneumologie näher beleuchtet werden. Hierbei können zahlreiche seltene pneumologische Erkrankungen, die in ihrem Anspruch an die Weiterentwicklung diagnostischer und therapeutischer Standards den genannten Entitäten keineswegs nachstehen, nicht berücksichtigt werden. Zudem bleibt festzuhalten, daß gerade auch die Pneumologie aufgrund der vielfachen Wechselwirkung der Atmungsorgane mit anderen Organsystemen (z.B. kardio-pulmonale Interaktion, z.B. pulmo-renale Syndrome, z.B. Interaktion des Respirations- mit dem Magen-Darm-Trakt) ihre zukünftige Entwicklung in enger Interaktion mit den anderen Schwerpunkten der Inneren Medizin nehmen wird.

Asthma bronchiale

Dem Asthma bronchiale liegt nach heutigem Verständnis eine chronische Entzündung des Bronchialsystems zugrunde, mit erhöhter Empfindlichkeit gegenüber einer Vielzahl von Reizen und den konsekutiven Symptomen der (reversiblen) Bronchialobstruktion, Bronchialwandverdickung und Dyskrie. Betroffen sind ca. 5% der erwachsenen und ca. 10% der kindlichen Bevölkerung. Die Prävalenz ist weltweit steigend, wofür eine zunehmende Belastung mit häuslichen und beruflichen Allergenen sowie Reizstoffen der inhalativen Umwelt (auch Modifikation der Allergene durch Umweltschadstoffe) verantwortlich sein könnte [9, 10]. Die Asthmamortalität ist in Deutschland gleichbleibend hoch.

Diagnostisch sind die Funktionstests der Bronchokonstriktion und der Atemwegsreagibilität weitgehend ausgereift, mit der Quantifizierung der NO-Exhalation ist das inflammatorische Geschehen der Bronchialwände non-invasiv meßbar geworden. Es kann erwartet werden, daß durch Weiterentwicklung biochemischer und molekularbiologischer Marker ein verbessertes Monitoring der Entzündungsvorgänge der Bronchialwand gelingt. Einen entscheidenden Fortschritt hinsichtlich des pathogenetischen Verständnisses und der individuellen Diagnostik würde es darstellen, wenn die komplette Aufdeckung der Kausalkette dieser paradigmatischen entzündlichen Erkrankung gelingt, unter Einbeziehung der genetischen Prädisposition, der relevanten Trigger-Substanzen (Allergene, inhalede Noxen, endogene Faktoren), der Hierarchie der beteiligten inflammatorischen Zellpopulationen und Kaskaden und des chronischen „Remodeling“ von Bronchialwandstrukturen.

Therapeutisch ist der Pneumologie mit den inhalativen Steroiden par excellence die Entwicklung einer topischen antiinflammatorischen Therapie gelungen, ergänzt durch ebenfalls topisch applizierte selektive Sympathomimetika und weitere antientzündliche Pharmaka wie die Leukotrienantagonisten. Ziel muß es sein, auf der Basis der Entschlüsselung der molekularen Abläufe Trigger des Geschehens zunehmend zu eliminieren und den Wirkungsgrad anti-inflammatorischer Therapiestrategien weiter zu erhöhen. Am Horizont zeichnet sich die Perspektive ab, daß hierdurch, gegebenenfalls unter Einbeziehung molekularbiologischer Techniken, eine weitgehende Eindämmung von Asthma-Morbidität und -Mortalität gelingen könnte.

Bronchitis

Die akute Bronchitis ist eine der häufigsten Erkrankungen des Menschen überhaupt, hat durch die hiermit verbundenen Fehlzeiten wesentliche epidemiologische Bedeutung und eine nicht zu unterschätzende Mortalität, insbesondere bei alten Menschen und Immunsupprimierten (siehe z.B. Influenza-Epidemien). Die Prävalenz der chronischen Bronchitis wird auf 10% der Erwachsenen geschätzt, von denen

ca. 20% eine chronische (nicht reversible) Atemwegsobstruktion entwickeln (chronisch-obstruktive Bronchitis) [11]. Diese Entwicklung kann zu chronischer respiratorischer Insuffizienz und Entstehung einer pulmonalen Hypertonie (Cor pulmonale) führen und ist mit erheblicher Einschränkung der Lebenserwartung verbunden.

Der Forschungsbedarf der akuten Bronchitis bezieht sich in erster Linie auf die Prävention, Erkennung und Therapie der mikrobiologischen, zumeist viralen, Auslöser, d.h. Impfstrategien, Diagnostik der viralen Infektion und antivirale Therapiekonzepte. Bei der chronischen Bronchitis sind die pathogenetischen Abläufe, welche bei Imbalance zwischen exogenen Noxen (inhalatives Rauchen, Luftverunreinigung, rekurrierende Infekte) und gegebener Disposition des Respirationstraktes (Zilienfunktion, lokale humorale und zelluläre Immunmechanismen, Steuerung inflammatorischer Prozesse) zu irreversiblen Umbauprozessen der Bronchialwege führen, was bislang nur in Ansätzen bekannt ist. Molekulargenetische Untersuchungen könnten neben zellbiologischen Studien den Schlüssel für das Verständnis der pathogenetischen Abläufe sowie die Basis für eine individuelle Risikoabschätzung liefern. Notwendig sind zudem diagnostische Verfahren, mittels derer unterhalb der Schwelle der manifesten Obstruktion in der Lungenfunktion das Ausmaß der initialen Bronchialepithelschädigung und des Remodeling der Bronchialwand erfaßt werden kann. Eine Verbesserung der mikrobiologischen Analytik zur raschen (möglichst non-invasiven) Erkennung viraler und bakterieller Infektion ist auch bei diesem Krankheitsbild in hohem Maße wünschenswert.

Therapeutisch wird der Schwerpunkt neben der Schadstoffkarenz, insbesondere bei genetischer Disposition, und der Bekämpfung von Infektionen in Zukunft vermehrt auf der pharmakologischen (und molekularbiologischen?) Intervention auf der Ebene der inflammatorischen Prozesse und des epithelialen und Bronchialwand-Remodeling liegen. Bei bereits eingetretenem Funktionsverlust und respiratorischer Insuffizienz haben die O₂-Langzeit-Therapie und die nicht-invasive Heimbeatmung, deren weitere Optimierung

in den nächsten Jahren zu erwarten ist, einen festen Stellenwert im therapeutischen Regime erhalten. Essentiell ist zudem, das gegenwärtige Verständnis und die Diagnostik der atemmuskulären Funktion und der muskulären Erschöpfungsmechanismen bei respiratorischer Insuffizienz weiter zu verbessern, um hierüber neue therapeutische Ansätze zur Aufrechterhaltung der optimalen alveolären Ventilation bei chronisch erhöhtem Atemwegswiderstand zu entwickeln. Lungentransplantationen werden aufgrund des Organmangels wohl auch in Zukunft die Ausnahme bleiben, auch wenn die Entwicklung transgener Tiere als Organspender hier eine Änderung einleiten könnte.

Lungenemphysem

Die sozioökonomische Bedeutung des Lungenemphysems, dem ein irreversibler Verlust von Lungenparenchymstrukturen mit konsekutiver Lungenüberblähung zugrunde liegt, ist nur unzureichend bekannt, jedoch weisen 10% aller Obduktion das Lungenemphysem als Haupt- oder wesentliche Teil-Todesursache aus [2]. Pathogenetisch scheint eine Imbalance aus endogener proteolytischer Aktivität (erhöht bei chronischer Inflammation, z.B. durch inhalative Noxen und rekurrierende Infektionen) und mangelndem Antiproteasen-Schutz im Vordergrund zu stehen. Dieses wird paradigmatisch offensichtlich für den angeborenen Gendefekt des α_1 -Protease-Inhibitors [12], der sich jedoch nur bei ca. 2% aller Emphysematiker findet. Im Vordergrund der Forschungsanstrengungen der nächsten Jahre steht dementsprechend das Bemühen, weitere relevante Antiprotease-Systeme zu identifizieren, mittels molekulargenetischer Analysen individuelle Prädispositionen für eine Emphysementwicklung zu erkennen und die inflammatorischen Mechanismen auf molekularer Ebene zu charakterisieren, die via leukozytäre Protease-Liberierung oder via (z.B. oxidative) Inaktivierung antiproteolytischer Kapazität dem progressiven pulmonalen Parenchymverlust Vorschub leisten.

Naheliegend ist es dann, als relevant identifizierte Faktoren für die Diagnostik der Emphysem-Prädisposition und des zum Emphysem führenden Prozesses mittels biochemischer und

molekularbiologischer Analysen zu nutzen, wie es gegenwärtig bereits für den α_1 -Protease-Inhibitor durchgeführt wird. Bildgebende Verfahren könnten dahingehend optimiert werden, daß sie in Ergänzung der klassischen Lungenfunktionsanalytik (welche Überblähung und Atemwegskollaps bei bereits eingetretenem Paranchymverlust erfaßt) frühzeitig eine Verschiebung des Stoffwechselgleichgewichtes in Richtung Geweberarifizierung erkennen.

Therapeutisch wird neben der Vermeidung provozierender Noxen (Rauchen, Umwelttoxine, Atemwegsinfekte) die selektive Beeinflussung der Protease-Antiprotease-Balance im Lungenparenchym zunehmend Bedeutung erlangen. Dieses kann mittels systemischer oder Aerosolapplikation von Antiproteasen selbst erfolgen (siehe gegenwärtiger Standard der α_1 -Protease-Inhibitor Substitution bei homozygoten Merkmalsträgern) sowie durch Maßnahmen zu ihrer Stabilisierung. Jedoch bieten sich auch gentherapeutische Korrekturen vor dem Hintergrund des inhalativen Zugangs zur Lunge für diese Erkrankung geradezu exemplarisch an. Nach Eintritt einer respiratorischen Insuffizienz gelten die bei der chronischen Bronchitis gemachten Ausführungen zur O₂-Langzeit-Therapie, nicht-invasiven Maskenbeatmung, Beeinflussung der Atemmuskulatur und Lungentransplantation. Kurzfristig ist eine weitere Klärung der Indikation und der Limitationen der seit einigen Jahren praktizierten volumenreduzierenden Emphysemoperationen zu erwarten.

Mukoviszidose

Der Mukoviszidose liegt ein Gendefekt des Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) Proteins zugrunde, welches die Chloridpermeabilität reguliert [6]. Mit einer Inzidenz von 1 Erkrankung auf 2–4000 Neugeborene und 2–5% gesunden Genträgern in der weißen Rasse (autosomal rezessive Vererbung) ist die Mukoviszidose die häufigste zum Tode führende Erbkrankheit. Eine Vielzahl von Mutationen des CFTR wurden zwischenzeitlich identifiziert. Pathogenetisch stehen für die pulmonalen Veränderungen die Eindickung des Bronchialsekretes mit rekurrierenden Infektionen, die im Verlauf nahezu obligate Besiedlung des

Bronchialbaumes mit *Pseudomonas aeruginosa* [13], die resultierende chronisch destruktive Bronchitis mit rezidivierenden Pneumonien und die terminale Entwicklung von respiratorischer Insuffizienz und Cor pulmonale im Vordergrund. Weiterer Forschungsbedarf besteht dahingehend, Korrelationen zwischen den verschiedenen Genotypen und Phänotypen der Erkrankung zu erstellen und die pathogenetische Sequenz insbesondere hinsichtlich der mikrobiellen Besiedlung zu verstehen.

Diagnostisch wird der klassische Schweißtest zunehmend durch die transepitheliale Potentialdifferenz-Messung und Genanalysen, die jedoch auch seltene Mutationen erfassen müssen, ersetzt. Therapeutisch ist durch spezielle Formen der Krankengymnastik, konsequente antibiotische Therapie und Behandlung der begleitenden Organstörungen (Pankreas, Darm) erreicht worden, daß der Großteil der Patienten das Erwachsenenalter erreicht und die Therapie in spezialisierten Zentren dann aus der Pädiatrie in die Pneumologie übergeht. Der Stellenwert der inhalativen Therapie mit Amilorid (Beeinflussung des bronchialen Elektrolytgleichgewichtes) und rekombinanter humaner DNase (Sekretverdünnung durch Spaltung langer DNA Ketten im Bronchialsekret) wird in den nächsten Jahren weiter charakterisiert werden.

Zusätzliche Entwicklungen betreffen die Optimierung der *Pseudomonas*-Prophylaxe und -Behandlung und die Verbesserung supportiver Therapieansätze im bronchialen Kompartiment (Antiproteasen, Antioxidanzien, Verbesserung des Sekrettransportes mittels Surfactant usw.). Die Mukoviszidose ist zur prototypischen Erkrankung für die inhalative Genkorrektur mit Einschleusung des korrigierten CFTR-Komplexes mittels geeigneter Vektoren in die bronchialen Zellen geworden, jedoch wird die klinische Umsetzung noch Jahre in Anspruch nehmen. Gegenwärtig besteht die einzige langfristige Überlebenschance in der noch zu optimierenden Lungentransplantation.

Pneumonie

Die Pneumonie, Infektion des Alveolarraumes und/oder Interstitiums der Lunge mit pathogenen Bakterien, Viren, Pilzen oder Protozoen, ist die häufigste zum Tode führende Infektionskrankheit und steht weltweit an der 5. oder 6. Stelle der Todesursachenstatistik überhaupt [14, 15]. Neben den ambulant erworbenen Pneumonien stellt die im Krankenhaus erworbene Form die wichtigste nosokomiale Infektion dar. Die direkten und indirekten Gesundheitskosten durch Pneumonien in Deutschland werden auf jährlich mehrere Milliarden DM geschätzt [1, 2]. Pathogenetisch steht die Auseinandersetzung der zumeist aerogen, seltener hämatogen, aquirierten Erreger mit den Abwehrmechanismen der Lunge im Vordergrund, mit Influx inflammatorischer Zellen, Infiltrat- und Ödembildung und konsekutiver Gasaustauschstörung im betroffenen Segment der Lunge. Auf dem Sektor der Interaktion zwischen mikrobiologischer Invasionskapazität und den bislang nur unzureichend verstandenen Host-Defense-Mechanismen der Lunge, die über inapparent verlaufende Infektion versus fulminante Pneumonie oder pneumogene Sepsis und Tod entscheiden, besteht noch grundlegender Forschungsbedarf.

Diagnostisch müssen die Verfahren verbessert werden, insbesondere unter Einschluß molekularbiologischer und biochemischer Techniken, um frühzeitig und möglichst non-invasiv (Sputum, Atemluftkondensat) eine mikrobiologische Besiedlung des Bronchoalveolarraumes nachzuweisen und zwischen Besiedlung und Gewebeinvasion zu unterscheiden.

Therapeutisch wird die antimikrobielle Therapie weiter im Vordergrund stehen, die jedoch aufgrund der bakteriellen Resistenzentwicklung und der gegenwärtigen Defizite bei der Behandlung von Virus- und Pilzinfektionen ständiger Weiterentwicklung bedarf. Topische Applikationstechniken unter Nutzung von Aerosolstrategien, wie bereits in der Aminoglykosidtherapie der Mukoviszidose etabliert, werden vermehrt Bedeutung erlangen. Impfstrategien, die gegenwärtig nur Pneumokokken und Influenza betreffen, sollten weiterentwickelt werden. Insbesondere wird jedoch eine gezielte Einflußnahme auf die Host-Defense-Mechanismen der Lunge auf der Basis eines verbesserten Verständnisses dieser Abläufe das therapeutische Instrumentarium zur Beherrschung pulmonaler Infektionen

erweitern, wie bereits in Ansätzen mit der Aerosolierung von Interferon und Interleukin-2 realisiert. Auf diesem Feld des Eingriffes in das Immunsystem der Lunge könnten auch molekularbiologische Interventionsstrategien einbezogen werden. Vital bedrohliche Verläufe der Pneumonie werden jedoch auch in Zukunft ein intensivmedizinisches Management verlangen (siehe dort).

Tuberkulose

Nach wie vor ist ca. 1/3 der Weltbevölkerung mit *Mycobacterium tuberculosis* infiziert. Zunehmende Migrationsentwicklung, die HIV-Pandemie und Resistenzentwicklungen gegenüber Tuberkulostatika sind der Grund dafür, daß der seit den 50er Jahren registrierte Rückgang der Tuberkulose in Deutschland stagniert. In extraeuropäischen Ländern (insbesondere in Afrika) ist es vor diesem Hintergrund zu einem dramatischen Wiederanstieg der Tuberkulose-Morbidität und -Mortalität gekommen. Hinsichtlich der Pathogenese dieser Infektionskrankheit, deren Primärmanifestation nahezu ausschließlich die Lunge betrifft, gelten die bei der Pneumonie gestellten offenen Fragen zur Interaktion zwischen Invasionsstrategien der Erreger und Host-Defense-Mechanismen der Lunge; ungeklärt sind weitgehend die für die „Virulenz“ der Erreger verantwortlichen Faktoren.

Diagnostisch wird neben dem direkten Keimnachweis die molekularbiologische Detektion des mikrobiellen Genoms in ihrer praktischen Aussagekraft zunehmend evaluiert werden, verbunden mit der prinzipiellen Perspektive, die molekulargenetische Analytik auch für die Bestimmung von Tuberkulostatika-Resistenzen zu nutzen. Techniken des molekulargenetischen „Fingerprinting“ können zur Aufdeckung von Infektionsketten genutzt werden.

Therapeutisch steht die konsequente Sicherstellung der ausreichend langen Behandlung mit potenten Tuberkulostatika-Kombinationen ganz im Vordergrund, die Entstehung und Ausbreitung von multiresistenten Mykobakterien muß vermieden werden. Risikogruppen bedürfen hinsichtlich Früherkennung der Tuberkulose und Therapieführung besonderer Überwachung. Eine verbesserte Immuntherapie (Impfung) könnte für Drittländer hinsichtlich der Beherr-

schung der Tuberkulose einen entscheidenden Fortschritt bringen.

Bronchialkarzinom

Das Bronchialkarzinom ist der häufigste maligne Tumor des Mannes und das zweithäufigste Malignom der Frau, mit steigender Tendenz. Die 5-Jahres-Überlebensrate aller Patienten mit Bronchialkarzinom liegt mit ca. 5% immer noch extrem niedrig. Inhalationsrauchen ist vor anderen umweltbezogenen und berufsbedingten Noxen die dominierende Ursache, und dessen Eindämmen durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit (Anti-Raucher Kampagnen) wird auch in den nächsten Jahren die entscheidende präventive Maßnahme darstellen. In den Fokus des öffentlichen Interesses ist auch zunehmend das Passivrauchen gerückt, dessen Stellenwert für die Entstehung des Bronchialkarzinoms durch weitere epidemiologische Studien in den nächsten Jahren noch weiter präzisiert werden wird.

Die Diagnostik basiert auf bildgebenden Verfahren und (endoskopisch)-biotischer Gewebegewinnung; sie wird von dem Einsatz neuer bildgebender Techniken (Endosonographie, Positronenemissionsszintigraphie, Immunszintigraphie) in Einzelfällen zusätzlich profitieren. Einen interessanten neuen Ansatz bieten photodynamische Verfahren: mittels photosensibilisierender Substanzen, die sich in maligne Zellen einlagern, werden diese während der Bronchoskopie fluoreszenzoptisch sichtbar gemacht werden. Ein großes Problem stellt gegenwärtig noch die für die Prognose der Erkrankung so wichtige Früherkennung des Bronchialkarzinoms dar, da Screening-Verfahren auf der Basis von Röntgenreihenuntersuchungen und der konventionellen zytologischen Untersuchung des Sputums enttäuscht haben. Die Hoffnung geht dahin, mittels (noch zu findender) aussagekräftiger Tumormarker oder molekularbiologischer Techniken der Sputumanalyse hier einen neuen Durchbruch zu erzielen.

Therapeutisch wird für die Gruppe der nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinome das operative Vorgehen, soweit die Tumorausdehnung dieses gestattet, als potentiell kuratives Verfahren auch weiterhin im Vordergrund stehen. Die adjuvante Strahlen- und Chemothera-

pie unter Nutzung neuer zytostatischer Substanzen (z.B. Taxane und platinhaltige Substanzen, z.B. Gemcitabine, z.B. Vinorelbine) wird wahrscheinlich jedoch einen zusätzlichen statistisch gesicherten Stellenwert in der Therapie der Nicht-Kleinzeller erhalten. Dieses könnte auch für neo-adjuvante Therapieansätze bei grenzwertiger chirurgischer Resezierbarkeit zutreffen. Bei diesen Formen des Bronchialkarzinoms konnten zudem palliative Behandlungsansätze unter Nutzung bronchoskopischer Verfahren wesentlich verbessert werden (bronchoskopische Laserabtragung, Stenteinlagen, Afterloading). Auch das genannte photodynamische Verfahren wird möglicherweise in diesem Zusammenhang zunehmend therapeutisch genutzt werden (Zerstörung photosensibilisierter Zellen mittels Laserlicht).

Bei den schnellwachsenden kleinzelligen Bronchialkarzinomen stellt die Chemotherapie den primären Behandlungsansatz dar, auch wenn in den seltenen Fällen sehr früher Erkennung des Tumors ein zusätzliches operatives Vorgehen in Erwägung zu ziehen ist. Über die empirische Austestung neuer Zytostatika-Kombinationen hinaus wird der Stellenwert der Hochdosis-Chemotherapie mit autologer Stammzelltransplantation, z.T. als „combined modality treatment“, in zukünftigen Studien geklärt werden.

Molekularbiologische Verfahren zur Manipulation des Genoms von Tumorzellen haben in der letzten Zeit neue Forschungsperspektiven eröffnet. Hierzu gehören Antisense-Verfahren, bei denen durch Transfer von Oligonukleotiden die Translation verantwortlicher Onkogene gehemmt wird, ebenso wie der Transfer von sogenannten Suizidgenen in die malignen entarteten Zellen. In diesem Zusammenhang ist auch die Stimulation der körpereigenen, gegen die Tumorzellen gerichteten, Immunantwort durch direkte Zufuhr von Zytokinen oder durch Transfektion entsprechender Zytokine zu nennen. Ein grundlegendes Problem stellt hierbei das gezielte Ansteuern der Tumorzellen dar, wobei sich der inhalative Zugang zur Lunge wiederum als nützlich erweisen könnte.

Pulmonale Hypertonie und Cor pulmonale

Bei mehr als 10% der Patienten, die an Herzinsuffizienz jeglicher Genese versterben, steht die Rechtsherzdekompensation bei pulmonaler Hypertonie im Vordergrund. Diese kann sich als sekundäre pulmonalvaskuläre Widerstandserhöhung bei zahlreichen pneumologischen Erkrankungen entwickeln (z.B. chronische Bronchitis, interstitielle Lungenerkrankungen, Mukoviszidose), wobei hypoxisch und inflammatorisch getriggerten Mechanismen der pulmonalen Vasokonstriktion und des Gefäßwand-Remodeling entscheidende Bedeutung zukommt. Zudem stellt die pulmonale Hypertonie eine gravierende Komplikation bei Rezirkulationsvitien und chronischer pulmonalvaskulärer Stauung (z.B. Mitralklappen) dar. Eigständig entwickelt sich die pulmonale Hypertonie post-embolisch (z.B. akute Thromboembolie der Lunge, chronische thromboembolische Strombahnverlegung) sowie ohne hinreichenden Auslöser bei der primären pulmonalen Hypertonie. Der pulmonalvaskulären Widerstandserhöhung mit Konsequenz für die rechtsventrikuläre Funktion kommt bei all diesen Erkrankungen wesentliche Bedeutung für das Ausmaß der Dyspnoe und die Verkürzung der Lebenserwartung zu. Pathogenetisch besteht hinsichtlich der zellbiologischen und molekularen Prozesse des Gefäßwand-Remodeling noch erheblicher Forschungsbedarf.

Diagnostisch stehen Belastungsuntersuchungen (Spiroergometrie), Echokardiographie und Rechtsherzkatheter, auch zur pharmakologischen Testung der pulmonalvaskulären Reagibilität auf vasodilatative Agenzien, neben Angiographie und CT-Verfahren im Vordergrund. Wünschenswert wäre die Entwicklung biochemischer oder molekularbiologischer Techniken, um einen beginnenden Umbauprozess der Lungenstrombahn unterhalb der Schwelle der manifesten Funktionseinschränkung zu erfassen, sowie molekulargenetische Studien zu Erkennung der individuellen Prädisposition.

Das therapeutische Vorgehen richtet sich zunächst nach der Grundkrankheit (z.B. O₂-Langzeittherapie, z.B. antiinflammatorische Strategien, z.B. Fibrinolyse und Thrombendarteriektomie).

mie). Darüber hinaus wurde das Konzept der inhalativen Applikation von aerosolisierten vasodilatativen Prostanoiden zur selektiven (ohne periphere Vasorelaxation) und supraselektiven (einhergehend mit Verbesserung des Perfusion-Ventilations-Matching) Vasodilatation entwickelt [4, 5]. Ergänzend kommt die ambulante Langzeitinfusion dieser Prostanoiden zur Anwendung. Beides ist mit der Hoffnung verbunden, auf diesem Weg zukünftig auch die Mechanismen des Remodeling zu beeinflussen. Unter Verwendung pharmakologischer oder molekularbiologischer Werkzeuge könnte zudem angestrebt werden, eine Neo-Angiogenese der im Querschnitt kritisch reduzierten Lungenstrombahn zu induzieren.

Schlafbezogene Atemstörungen

Für schlafbezogene Atemstörungen mit Obstruktion der extrathorakalen Atemwege (obstruktive Schlafapnoe, partielle pharyngeale Obstruktion) und solche ohne Obstruktion (Hypoventilationssyndrome) wird von einer Prävalenz von zumindest 2–4% der Gesamtbevölkerung ausgegangen [16]. Neben der Tagesmüdigkeit (Unfallgefährdung) stehen als Konsequenzen kardiovaskuläre (Bluthochdruck, Myokardinfarkt, Apoplex) und pulmonale (respiratorische Insuffizienz, pulmonale Hypertonie) Folgeerkrankungen im Vordergrund; die kumulative Überlebensrate ist gegenüber der Gesamtbevölkerung signifikant vermindert. Pathogenetisch konnten zum Verständnis der zentralen Atemregulation und ihrer Störungen entscheidende Fortschritte gemacht werden, die Mechanismen der zentralen Mikroaktivierungsreaktionen, die unmittelbar mit der Schlaffragmentierung und dem Verlust an Tiefschlaf in Zusammenhang stehen, sind jedoch noch unvollständig verstanden. Dieses trifft auch auf die Auslösungsmechanismen der kardiovaskulären und pulmonalen Folgeerkrankungen zu.

Diagnostisch stellt die polysomnographische Untersuchung im komplett eingerichteten schlafmedizinischen Labor den Goldstandard dar, Verbesserungen sind jedoch noch auf dem Gebiet des Screening im Vorfeld der schlafmedizinischen Untersuchung zu erwarten. Die nasale Ventilationstherapie (nCPAP, BiPAP) ist der entscheidende therapeutische Fortschritt der letz-

ten Jahre, der technisch noch weiter optimiert werden wird (z.B. „intelligente“ Systeme mit Auto-CPAP). Es kann zudem erwartet werden, daß die Indikationen und Limitationen prothetischer und chirurgischer Therapieansätze in den nächsten Jahren befriedigender evaluiert werden. Eine suffiziente medikamentöse Therapie zur gezielten Beeinflussung der atemregulatorischen Störungen konnte bislang nicht entwickelt werden, würde jedoch einen weiteren grundlegenden Fortschritt darstellen.

Interstitielle Lungenerkrankungen

Interstitielle Lungenerkrankungen (ILD) stellen eine ätiologisch heterogene Gruppe dar, die sich durch nicht-infektiöse inflammatorische Prozesse im interstitiellen und z.T. alveolären Kompartiment der Lunge mit Progredienz zur Lungenfibrosierung auszeichnet. Erkrankungen unbekannter Ätiologie (z.B. Sarkoidose, idiopathische Lungenfibrose) und solche bekannter Ätiologie (z.B. exogen-allergische Alveolitis, Strahlenpneumonitis) werden unterschieden, insgesamt ist von mehr als 130 Differentialdiagnosen innerhalb der Gruppe der ILD auszugehen.

Für das pathogenetische Verständnis und die Diagnostik hat die Analyse der bronchoalveolären Lavage (konventionelle Zytologie, Immunzytologie incl. FACS, biochemische Verfahren, mikrobiologische Analytik, zunehmend molekularbiologische Verfahren) neben der Untersuchung von Lungenparenchymbiopsien wesentliche Fortschritte erbracht. Es wird dennoch großer Anstrengungen der nächsten Jahre bedürfen, die molekularen Mechanismen, die der Fehlsteuerung der Inflammation, Fibroblastenproliferation und Matrixdeposition zugrunde liegen, im Detail zu verstehen, um auf dieser Basis eine umfassende diagnostische Aussage aus Lavage und Biopsie zu gewinnen. Es ist davon auszugehen, daß im Zuge dieser diagnostischen Verbesserungen auch die Prognoseabschätzung und die Therapieentscheidung auf eine breitere Basis gestellt werden.

Therapeutisch stehen gegenwärtig nur Kortikosteroide, in Einzelfällen Immunsuppressiva, O₂-Langzeittherapie, nicht-invasive Beatmung im progredienten Stadium und die Lungentrans-

plantation mit den oben genannten Einschränkungen zur Verfügung. Es ist jedoch naheliegend, daß sich aus der Kombination eines verbesserten Verständnisses der molekularen Abläufe und dem inhalativen Zugang zum Lungenparenchym in Zukunft neue Therapiestrategien zur Intervention auf der Ebene der pathogenetischen Abläufe ergeben werden. Gezielte Eingriffe in das Zytokinnetzwerk, Antioxidanzien, Antagonisten von Adhäsionsmolekülen, Surfactant und anti-proliferative Agenzien sind Schlagworte für Therapiestrategien, die gegenwärtig bereits experimentell überprüft werden.

Akutes Lungenversagen und pneumologische Intensivmedizin

Das ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) ist eine akute Funktionsstörung des Gasaustausches der Lunge, die mit nicht-kardiogener Ödembildung, diffuser Atelektasenentstehung und schwerwiegender Ventilations-Perfusions-Verteilungsstörung incl. Shuntfluß einhergeht.

Ätiologisch wird zwischen direkten Auslösern des Geschehens (z.B. Aspiration, Pneumonie, Inhalation toxischer Gase) und indirekten Auslösern (z.B. Sepsis, Polytrauma, Pankreatitis) unterschieden. Es besteht eine enge pathogenetische Verbindung zwischen ARDS und Sepsis (Sepsis→ARDS; ARDS→pneumogene Sepsis) sowie dem Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) und somit zwischen ARDS und Multiorganversagen. Diese Konstellation ist die quantitativ dominierende Todesursache im Intensivbereich weltweit. Die Bedeutung der Aktivierung von inflammatorischen Kaskadensystemen für die Pathogenese des ARDS konnte belegt werden, jedoch steht eine hierarchische Ordnung der Bedeutung der zahlreichen beteiligten humoralen und zellulären Systeme noch aus. Deutlich geworden ist zudem die Rolle des Surfactantsystems, der Sekundärschädigung durch die Beatmung (Ventilator-induced Lung Injury [VILI]) und der Liberation von bakteriellen Produkten sowie inflammatorischen Mediatoren aus dem Kapillarbett der Lunge in die systemische Zirkulation.

Diagnostisch ist über das gegenwärtig genutzte Instrumentarium hinaus zu hoffen, daß die Entwicklung ver-

läßlicher Marker (biochemisch, zellulär, molekularbiologisch) gelingt, mittels derer die Entwicklung eines ARDS frühzeitig signalisiert wird und eine Prognoseabschätzung vorgenommen werden kann. Gegenwärtig werden zahlreiche molekulargenetische Analysen durchgeführt, um mögliche individuelle Prädispositionen für die Entwicklung eines ARDS zu definieren.

Therapeutisch sind zwar auf „polypragmatischem“ Weg mit der Senkung der ARDS-Mortalität (auf gegenwärtig ca. 40%) Fortschritte erzielt worden, jedoch gelang bislang kein Ansatz, auf der Ebene der Pathogenese des ARDS gezielt anti-inflammatorisch zu intervenieren. Der Stellenwert inhalativer Vasodilanzien (NO, aerosolisiertes Prostacyclin) ist offen. Mit Sicherheit werden in den nächsten Jahren die Beatmungsmodi, inklusive nicht-invasiver Techniken, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung von VILI, pneumogenem SIRS und pneumogener Sepsis weiter optimiert werden. Mit Interventionen auf der Ebene des Surfactantsystems zur Verbesserung des Gasaustausches und zur Vermeidung mechanischer Lungenschädigung sind große Hoffnungen verbunden [17]. Ebenso stellt die selektive Beeinflussung der Host-Defense-Mechanismen der Lunge, bevorzugt auf inhalativem Weg, ein mögliches Entwicklungskonzept der nächsten Jahre dar.

Umwelt- und Berufserkrankungen der Lunge

Mit ihrer ca. 100 m² großen Oberfläche und 10.000–20.000 Liter Atemluft pro Tag stellt die Lunge ein „Umweltorgan“ par excellence dar. Neben den klassischen arbeitsmedizinisch relevanten Noxen wie Quarzstaub, Asbestfasern und Kohlepartikel sind inhalative Faktoren der allgemeinen Umwelt zunehmend in den Vordergrund getreten. Die Problematik besteht darin, daß über SO₂, Ozon, Stickstoffoxide und Feinstäube hinaus eine extreme Vielfalt industriell genutzter Substanzen in der Atmosphäre nachweisbar ist und der Stellenwert möglicher schädlicher Noxen angesichts denkbarer Kombinationswirkungen dieser Substanzen nahezu unüberschaubar wird. Hinzu kommen inhalative Komponenten der Raumluft in zunehmend besser isolierten

Häusern („in-door air pollution“) sowie die Entstehung neuer oder stärker immunisierender Allergenstrukturen durch Kontakt natürlicher Allergene mit Substanzen der industriellen Umwelt. Die Bedeutung inhalativer Umwelttoxene für die Entstehung des Bronchialkarzinoms, des Pleuramesothelioms, der chronischen Bronchitis und des Asthma bronchiale ist belegt [18].

Eine Analyse der Zusammenhänge wird jedoch dadurch erschwert, daß z.T. eine extreme Latenz zwischen Exposition und Folgeschaden besteht (z.B. Häufigkeitsgipfel der Asbestexposition ca. 1980, Häufigkeitsgipfel des Pleuramesothelioms ca. 2010–2015 zu erwarten). Eine Vielzahl epidemiologischer Fragen zum Stellenwert einzelner Komponenten der inhalativen Umwelt ist dementsprechend noch offen und Gegenstand laufender Studien, die unser Bild der umweltbedingten Lungenschäden kontinuierlich erweitern werden (z.B. Stellenwert künstlicher Mineralfasern). Von molekulargenetischen Untersuchungen kann erhofft werden, daß individuelle Prädispositionen zur Gefährdung gegenüber bestimmten inhalativen Noxen definiert werden [19]. Es ist offensichtlich, daß Präventivmaßnahmen auf dem Gebiet der umweltbedingten Lungenschäden zunehmende Bedeutung zukommt, deren Basis jedoch wiederum die Erkennung des Stellenwertes einzelner potentieller Noxen darstellt.

Fazit für die Praxis

Aus dem Spektrum pulmonaler Erkrankungen seien nur die wichtigsten besprochen und punktuell einige wesentliche Entwicklungsperspektiven und Probleme aufgezeigt:

Asthma bronchiale. Die weltweit steigende Prävalenz wird mit 10% bei Kindern und 5% bei Erwachsenen angegeben. Diagnostisch sind die Funktionstests der Bronchokonstriktion und Atemwegsreagibilität weitgehend ausgereift, durch Messung der NO-Exhalation wird das inflammatorische Geschehen der Bronchialwände meßbar. Von molekularbiologischen Methoden erhofft man sich genauere Aufschlüsse zu genetischer Prädisposition und ein besseres Monitoring von Entzündungsvorgängen. Therapeutisch haben sich inhalative

Steroide und topisch applizierte Sympathikomimetika bewährt. Leukotrienantagonisten haben das therapeutische Arsenal erweitert.

Bronchitis. Akute und chronische Bronchitis haben große epidemiologische Bedeutung, nicht zuletzt als Initialstadium der chronischen Atemwegsobstruktion. Von molekularbiologischen Untersuchungen verspricht man sich ein besseres Verständnis irreversibler Umbauprozesse der Bronchialwege. Therapeutisch gilt es, diese frühzeitig zu beeinflussen. Die non-invasive Heimbeatmung stellt eine wesentliche therapeutische Weiterentwicklung für Patienten im Endstadium der Erkrankung dar.

Lungenemphysem. Pathogenetisch scheint das Ungleichgewicht zwischen proteolytischer Aktivität einerseits und mangelndem Antiproteasen-Schutz andererseits eine wichtige Rolle zu spielen. Dies versucht man therapeutisch selektiv zu beeinflussen. Vermeidung von Noxen und Sauerstoff-Langzeitbehandlung haben einen unverändert wichtigen Stellenwert; die volumenreduzierende Emphysemchirurgie hat das therapeutische Spektrum erweitert.

Mukoviszidose. Die Inzidenz Neugeborener liegt bei 1–2/4.000, der Prozentsatz gesunder Genträger bei 2–5%. Die Diagnostik wurde durch Genanalyse und transepitheliale Potentialdifferenzierung erweitert. Neben bewährter Krankengymnastik und Inhalationstherapie wird neuerdings rekombinante humane DNAse zur Sekretverflüssigung eingesetzt. Effektivere Pseudomonas-Prophylaxe, Antiproteasen, Antioxidantien und intensive Sekretolyse könnten zu einer weiteren Verbesserung der Lebenserwartung beitragen.

Pneumonie. Die häufigste zum Tode führende Infektion läßt hinsichtlich der Interaktion zwischen mikrobieller Invasionskapazität und den Host-Defense-Mechanismen der Lunge noch viele Probleme ungeklärt. Neben antimikrobieller Behandlung finden topische Applikationstechniken durch Inhalation immer häufigere Anwendung. Problematisch bleiben zunehmende bakterielle Resistenzentwicklung und Defizite der Therapie von Virus- und Pilzinfektionen.

Tuberkulose. Hauptprobleme sind Migration, HIV-Infektion, andere immunkompromittierende Zustände und Resistenzent-

wicklung. Die Zahl der Neuerkrankungen stagniert hierzulande, nimmt aber weltweit zu. Diagnostisch wird neben direktem Keimnachweis der molekularbiologische Erregernachweis immer wichtiger. Therapeutisch werden die Tuberkulostatika-Kombinationen der Entwicklung angepaßt, präventiv setzt man auf verbesserte Impfmöglichkeiten große Hoffnung.

Bronchialkarzinom. Der häufigste Tumor des Mannes, der zweithäufigste der Frau, ist mit einer extrem niedrigen 5-Jahres-überlebensrate trotz besserer Diagnostik, z.B. durch photodynamische Verfahren, ein kaum gelöstes Problem. Bei nicht-kleinzelligem Karzinom werden neben operativem Vorgehen Erwartungen auf adjuvante Strahlen- und Chemotherapie gesetzt, bei kleinzelligem steht die Chemotherapie im Vordergrund. Ob durch die Applikation von Oligonukleotiden mittels Antisense-Verfahren Onkogene gehemmt werden können und dies eine therapeutische Option werden könnte, wird gegenwärtig untersucht.

Pulmonale Hypertonie, Cor pulmonale. Hypoxisch und inflammatorisch getriggerte Mechanismen sind die häufigsten Ursachen der pulmonalen Vasokonstriktion und des Gefäßwand-Remodeling bei pulmonaler Hypertonie. Wie diese Entwicklung auf zellbiologischer und molekularer Ebene abläuft, ist noch weitgehend unbekannt. Neben der Therapie der Grundkrankheit hat die Dauerapplikation vasodilatativer Prostanoiden (als Aerosol oder Langzeit-Infusion) das therapeutische Arsenal wesentlich erweitert. Die selektive Beeinflussung der vaskulären Umbauprozesse auf molekularer Ebene stellt ein Behandlungsziel der Zukunft dar.

Interstitielle Lungenerkrankungen. Die Differentialdiagnostik dieser komplexen Krankheitsgruppe ist durch die Entwicklung der Lavage-Analytik wesentlich erweitert worden. Es wird erwartet, daß selektive antiinflammatorische Strategien das theoretische Arsenal aus Kortikosteroiden sowie im Ausnahmefall Immunsuppressiva wesentlich erweitert werden.

ARDS. Ob es möglicherweise eine genetisch bedingt Prädisposition für die Entwicklung des ARDS (Adult Respiratory Distress Syndrome) gibt, wird untersucht. Eine selektive Beeinflussung der Host-Defense-Mechanismen der Lunge erscheint vielversprechend, ebenso wie transbronchiale Surfactant-Applikation. Die Vermeidung von „Ventilator-induced Lung Injury“ und pneumogener Pepsis wird in Zukunft zunehmender Bedeutung erlangen.

Umwelt- und berufsbedingte Erkrankungen. Diese haben eine große Bedeutung, wobei diagnostisch die lange Latenzzeit zwischen Exposition und Folgeschaden problematisch ist. Auch hier hofft man, daß gentechnische Untersuchungen hilfreich sind, um individuelle Prädispositionen zu erkennen und somit wirksame Prävention zu betreiben. Die Charakterisierung relevanter inhalativer Noxen ist noch lange nicht abgeschlossen.

Schlafbezogene Atemstörungen. Mit einer Prävalenz von 2–4% der Gesamtbevölkerung, gravierenden pulmonalen, kardialen und zerebralen Komplikationen sind schlafbezogene Atemstörungen ein wichtiges pneumologisches Krankheitsbild. Die gerade im letzten Jahrzehnt vielerorts, besonders natürlich in Zentren eingerichteten Schlaflabors haben nicht nur zur wesentlich verbesserten Diagnostik und Therapie geführt sondern auch wichtige Beiträge zum Verständnis von Physiologie und Pathophysiologie der Atmung geleistet.

Literatur

1. Statistisches Bundesamt: **Statistisches Jahrbuch, Jahrgang 1968–1995.** Kohlhammer-Verlag, Stuttgart und Mainz
2. Pneumologie, **Weißbuch Lunge**, II. Sonderheft 50. Jahrgang, September 1996
3. Konietzko N (1995) **Pneumologie Deutschland – Ein Stiefkind.** Dtsch Ärztebl 92:2177–2178
4. Walrath D, Schneider T, Pilch J, Grimminger F, Seeger W (1993) **Aerosolised prostacyclin reduces pulmonary artery pressure and improves gas exchange in the adult respiratory distress syndrome (ARDS).** Lancet 342:961–962

5. Olschewski H, Walrath D, Schermuly R, Ghofrani HA, Grimminger F, Seeger W (1996) **Aerosolised prostacyclin and iloprost in primary pulmonary hypertension.** Ann Intern Med 124:820–824
6. Welsh JM (1993) **Molecular mechanisms of CFTR chloride channel dysfunction in cystic fibrosis.** Cell 73:1251–1254
7. Fink L, Seeger W, Ermert L, Hänze J, Stahl U, Grimminger F, Kummer W, Bohle RM (1998) **Real-time quantitative RT-PCR after laser-assisted cell picking.** Nature Med 4:1329–1333
8. Suzuki M, Singh RN, Crystal RG (1997) **Ability of a chimeric cAMP-responsive promoter to confer pharmacologic control of CFTR cDNA expression and cAMP-mediated Cl-secretion.** Gene Ther 4:1195–1201
9. Ayres JG, Miles JF, Barnes PJ (1998) **Brittle asthma.** Thorax 53:315–321
10. Jöres R, Nowak D, Magnussen H (1996) **The effect of ozone exposure on allergen responsiveness in subjects with asthma or rhinitis.** Am J Respir Crit Care Med 153:56–64
11. Konietzko N (1995) (Hrsg) **Bronchitis, Bronchiolitis, Bronchiektase.** Urban und Schwarzenberg, München
12. Mason RJ, Crystal RG (1998) **Pulmonary cell biology.** Am J Respir Crit Care Med 157:572–81
13. Walter S, Gudowius P, Bosshammer J, Romling U, Weissbrodt H, Schürmann W, von der Hardt H, Tümmler B (1997) **Epidemiology of chronic Pseudomonas aeruginosa infections in the airway of lung transplant recipients with cystic fibrosis.** Thorax 52:318–321
14. Schaberg T, Dalhoff K, Lorenz J, Mauch H, Wilkens H, Witt C (1997) **DGP: Empfehlungen zur Diagnostik der ambulant erworbenen Pneumonie.** Pneumologie 51:69–77
15. Schaberg T, Dalhoff K, Ewig S, Lorenz J, Wilkens H (1998) **DGP: Empfehlungen zur Therapie der ambulant erworbenen Pneumonie.** Pneumologie 52:450–462
16. Peter JH, Penzel T, Cassel W, von Wichert P (1993) **Schlaf, Atmung, Kreislauf.** Springer, Berlin Heidelberg New York
17. Seeger W, Günther A, Walrath D, Grimminger F (1999) **Pulmonary Surfactant.** In: Oxford Textbook of Critical Care Medicine. Oxford University Press, in press
18. Norpoth K, Witowitz HJ (1994) **Beruflich verursachte Krebserkrankungen.** Deutscher Ärzte-Verlag, Köln
19. Baur X (1992) **Molekularbiologische Forschungsansätze zur Pathogenese berufsbedingter obstruktiver Atemwegserkrankungen.** Arbeitsmed Sozialmed Präventivmed 27:102–109