Redaktion

B. Koletzko, München
S. Stöckler-Ipsiroglu, Wien

Die Beiträge der Rubrik „Weiter- und Fortbildung“ sollen dem Facharzt als Repetitorium dienen und dem Wissenstand der Facharztprüfung für den Arzt in Weiterbildung entsprechen. Die Rubrik beschränkt sich auf gesicherte Aussagen zum Thema.

W. Handrick¹ · C. von Eiff²

¹ Klinik und Poliklinik für Kinder und Jugendliche, Universität Leipzig

² Institut für Medizinische Mikrobiologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Durch *Staphylococcus aureus* verursachtes Toxic-shock-Syndrom

Menstruelles und nicht-menstruelles TSS

Das TSS kommt selten vor

Es erkranken v. a. jüngere Erwachsene und Adoleszenten

Staphylococcus-aureus-Stämme der Phagengruppe 1, die Toxin produzieren

► **Primäre *Staphylococcus-aureus*-Infektionen**

► **Sekundäre *Staphylococcus-aureus*-Infektionen**

Das durch *Staphylococcus aureus* verursachte Toxic-shock-Syndrom (TSS) ist eine akute febrile, exanthematische, multisystemische Erkrankung. Obwohl das TSS 1978 von Todd et al. erstmals bei Kindern beobachtet wurde, setzte man diese Erkrankung in den folgenden Jahren praktisch mit dem menstruellen TSS gleich. In der Folgezeit nahm aber der Anteil menstrueller Fälle ab und der nicht-menstrueller TSS-Fälle zu (1994 in den USA 42%). Die Bedeutung des TSS liegt v. a. in der nicht unerheblichen Akutletalität und dem Risiko bleibender Spätfolgen.

Epidemiologie

TSS-Erkrankungen sind relativ selten. Bei entsprechenden Symptomen und Befunden wird deshalb oft erst spät oder gar nicht an ein TSS gedacht. Heute erkranken v. a. jüngere Erwachsene, aber auch Kinder beiderlei Geschlechts. In den USA lag das Durchschnittsalter der Patienten mit menstruellem TSS seit den 80er Jahren bei 22–23 Jahren, das der Patienten mit nicht-menstruellem TSS (Frauen und Männer) bei 27–30 Jahren. 1994 betrug der Anteil nicht-menstrueller TSS-Fälle in den USA 42%. Kinder <10 Jahren erkranken sehr selten an einem TSS. Beim TSS handelt es sich meist um sporadische Erkrankungen, vereinzelt wurde auch über nosokomiale Infektionen berichtet.

Ätiopathogenese

Der bakterielle Erreger des TSS ist *Staphylococcus aureus*. Für das menstruationsassoziierte Krankheitsbild wurden Isolationsraten von *Staphylococcus aureus* bei vaginal- bzw. Zervixabstrichen zwischen 74 und 98% berichtet, bei gesunden menstruierenden Frauen lagen die Trägerraten dagegen mit 1,5–16% deutlich niedriger. Die Staphylokokkenstämme beim TSS gehören meist zur Phagengruppe 1, speziell wurden die Phagentypen 29 und 52 gefunden. Bei manchen TSS-Patienten handelt es sich offensichtlich „nur“ um eine Besiedlung (z. B. Vagina, Respirationstrakt), in vielen Fällen aber um eine Infektion durch Toxin produzierende *Staphylococcus-aureus*-Stämme.

Bei ► **primären** durch *Staphylococcus aureus* verursachten Infektionen kommt es überwiegend zu Haut-, Schleimhaut- und Weichteilinfektionen (z. B. Abszesse, Phlegmonen), seltener zu „tieferen“ Organinfektionen (z. B. Osteomyelitis, Arthritis, Pyomyositis, Endokarditis, Pneumonie, Tracheitis, Sinusitis, Nierenabszess, Mastitis) bzw. Sepsis.

Zu den ► **sekundären *Staphylococcus-aureus*-Infektionen**, die durch ein TSS kompliziert werden können, zählen solche nach Operationen, Instrumentationen, thermischen Schädigungen, Insektenstichen, Verletzungen, respiratorischen Virus-

Prof. Dr. W. Handrick

Ärztliches Labor Dr. Berthold & Koll., Am Kleistpark 1, 15230 Frankfurt/Oder

Vaginaltampons als Risikofaktor

► Toxin-Spektrum

► Toxic-shock-Syndrome-Toxin-1 (TSST-1)

► Enterotoxin B

► Enterotoxin C

► Superantigene

► Zytokin-ausschüttung

► Anti-TSST-1-Antikörper

infektionen, Varizellen, Geburt bzw. Abort. Der zeitliche Abstand zum vorausgegangenen Eingriff kann beim postoperativen TSS einige Tage bis mehrere Wochen betragen (u.U. ist der Patient bei Beginn der Symptomatik bereits aus der Klinik entlassen).

Dass die Verwendung von vaginalen Tampons während der Menstruation einen signifikanten Risikofaktor darstellt, konnte in mehreren kontrollierten Studien in den USA nachgewiesen werden (über 90% der Patientinnen mit menstruellem TSS benutzten Tampons). Besonders Tampons mit hoher Saugfähigkeit wurden mit dem Auftreten eines TSS assoziiert. Typischerweise tritt das menstruelle TSS in der Zeit zwischen Mitte und Ende einer Menstruation auf.

Staphylococcus-aureus-Toxine

Das ► **Spektrum** der von *Staphylococcus aureus* gebildeten Toxine umfasst u. a. Hämolysine, die epidermolytischen Toxine (Exfoliativtoxine) ETA und ETB, Toxic-shock-Syndrome-Toxin1 (TSST-1) und mehrere Enterotoxine. Neben den klassischen Enterotoxinen SEA-SEE ist die Reihe der Enterotoxine in den letzten Jahren durch weitere Vertreter (SEG, SEH, SEI, SEJ) ergänzt worden.

Neben durch das TSST-1 ausgelösten Schocksyndromen wurden auch solche durch die Enterotoxine B, C und H beschrieben. TSST-1-negative Stämme von *Staphylococcus aureus*, die ein TSS hervorrufen, bilden dabei ein oder mehrere dieser Enterotoxine.

Das ► **TSST-1**, zuerst als „Enterotoxin F“ bezeichnet, wurde bei 90–100% der *Staphylococcus-aureus*-Stämme von menstruellen und bei 40–60% der Stämme von nicht-menstruellen TSS-Patienten nachgewiesen. ► **Enterotoxin B** kommt bei 40–50% der *Staphylococcus-aureus*-Stämme von nicht-menstruellen TSS-Fällen vor. Dagegen wird der heterogene ► **Enterotoxin C**-Typ (SEC₁₋₃, SEC_{Bovine}, SEC_{Ovine}) nur selten (3%) als Erreger von nicht-menstruellen TSS-Fällen gefunden.

Entsprechende Untersuchungen haben ergeben, dass ein bestimmtes Milieu (ähnlich dem in der Vagina während der Menstruation) die Toxinproduktion fördert (neutraler pH, hohe Pco₂-Konzentration, hohe Proteinkonzentration).

Die genannten Toxine gehören zu pyrogenen Exotoxinen, die als ► **Superantigene** fungieren, d. h. sie stimulieren bereits in geringen Konzentrationen T-Lymphozyten, die über eine spezifische V-β-Region verfügen. Durch die Stimulation kommt es

zu einer massiven ► **Ausschüttung verschiedener Zytokine** (IL-1, TNF-α), die komplexe, sich verstärkende Wechselwirkungen aufweisen. Klinische Folgen der massiven Zytokinausschüttung sind Fieber, Absinken des Gefäßtonus, Endothelschädigung („capillary leak syndrome“), Hypotension, interstitielles Ödem, vaskuläre Kongestion, ischämische Organschädigung.

Histologisch finden sich keine Hinweise auf eine bakterielle Invasion, sondern nur minimale Entzündungsreaktionen, perivaskuläre mononukleäre Infiltrate und interstitielles Ödem (TNF-α hemmt die Mobilisierung der neutrophilen Granulozyten).

Antikörper gegen Staphylococcus-aureus-Toxine

Ob es bei einem Menschen mit Besiedlung bzw. Infektion durch einen Toxin produzierenden *Staphylococcus-aureus*-Stamm zu einem TSS kommt oder nicht, hängt auch davon ab, ob der Patient über ► **Anti-TSST-1-Antikörper** verfügt.

Viele Erwachsene erwerben solche Antikörper, ohne an einem TSS erkrankt gewesen zu sein. So haben 90% der gesunden Erwachsenen entsprechende Antikörpertiter. Personen, die keine Anti-TSST-1-Antikörper aufweisen, hatten of-

Tabelle 1
Diagnostisch relevante klinische Symptome und Befunde bei Toxic-shock-Syndrom

Hauptkriterien

- Fieber (>38,9°C)
- Haut: diffuse, makuläre Erythrodermie
- Nach 1–2 Wochen Schuppung (Handinnenflächen, Fußsohlen, Finger, Zehen)
- Herz-Kreislauf: Hypotension, orthostatische Dysregulation, Tachykardie, Zyanose, Ödeme, Schock

Nebenkriterien

- Schleimhaut (Konjunktiva, Pharynx, Vagina): Hyperämie, Ulzera
- Magen-Darm-Trakt: Erbrechen, wässrige Durchfälle, Bauchschmerzen
- Muskulatur: Myalgien
- Lunge: Tachypnoe, ARDS
- Niere: Oligurie, Kreatininanstieg
- Leber: Anstieg von Transaminasen/Bilirubin
- Blut: Thrombozytopenie, DIC
- ZNS: Kopfschmerzen, Somnolenz, Konfusion (keine fokalen Zeichen)

Tabelle 2
Hinweisende Laborbefunde beim TSS

Blut

Pathologische Nieren und Lebertests
Neutrophilie, Linksverschiebung,
Anämie
Thrombozytopenie
Pathologische Gerinnungswerte
Hypokalzämie, Hypophosphatämie
Erhöhte Kreatinphosphokinase
Meist negative Blutkulturen

Urin

„Sterile“ Leukozyturie

Liquor

Pleozytose

Punktate, Eiter, Abstriche

Staphylococcus-aureus-Nachweis

Fast alle Organe können betroffen sein

Hauptkriterien der CDC:
Fieber, Erythrodermie,
Hautschuppung, Hypotension

► **Laboruntersuchungen**

Ein negativer bakteriologischer Befund schließt das Vorliegen eines TSS nicht aus.

Die serologische Untersuchung ist keine Routinemethode!

fenbar noch keinen Kontakt mit Toxin produzierenden *Staphylococcus-aureus*-Stämmen oder aber sie sind nicht in der Lage, solche Antikörper zu produzieren. Letzteres dürfte v. a. bei Frauen mit rezidivierenden menstruellen TSS-Episoden eine Rolle spielen. Möglicherweise kommt es auch im Rahmen des TSS zu einer Hemmung der Antikörpersynthese.

Klinische Symptome und Befunde

Das TSS ist eine akut bzw. perakut beginnende multisystemische Erkrankung. Bei schlechtem Allgemeinzustand können fast alle Organe des Körpers mehr oder weniger betroffen sein.

Ein TSS liegt vor, wenn die in Tabelle 1 aufgeführten Hauptkriterien und ≥ 3 Nebenkriterien erfüllt sind (CDC-Kriterien).

Nicht selten beginnt die Erkrankung akut mit Fieber, Erbrechen und Durchfall. Typisch sind systolische Blutdruckwerte von <90 mmHg bzw. bei Kindern unterhalb der 5. Perzentile der altersspezifischen Normwerte. Das Exanthem wird als sonnenbrandähnlich bzw. skarlatiniform beschrieben.

Auch Gallenblasenhydrops und Pankreatitis können vorkommen. Ausgeprägte Ödeme sind weniger bedingt durch Nierenversagen oder Hyperhydratation, sondern v. a. Folge des „capillary leak syndrome“, d. h. die intravasale Flüssigkeit diffundiert ins Gewebe.

Diagnostik

Die Diagnose „TSS“ kann durch verschiedene, z. T. aufwändige ► **Laboruntersuchungen** gestützt werden: Untersuchung der *Staphylococcus-aureus*-Stämme zur Detektion der Toxinproduktion, Nachweis der Toxingene mittels PCR, Nachweis von Antikörpern gegen TSST-1 und SEB im Patientenserum, Bestimmung des Anteils V- β_2 -positiver Lymphozyten.

In der Routinediagnostik basiert die Diagnose aber letztendlich auf der Synopse klinischer Symptome und Befunde sowie hinweisender Laborbefunde. Tabelle 2 enthält wichtige, auf ein TSS hinweisende Laborbefunde.

Nachweis von *Staphylococcus aureus*

Je nach klinischer Situation sollte versucht werden, den „Fokus“ zu identifizieren und in Sekreten (Vagina, Wunden), Abstrichen (Nase, Rachen), Urin, Blut oder Liquor den Erreger nachzuweisen. Zur mikrobiologischen Diagnosesicherung können isolierte *Staphylococcus-aureus*-Stämme auf ihre Fähigkeit zur Toxinbildung untersucht werden. Es ist jedoch zu beachten, dass Toxin bildende *Staphylococcus-aureus*-Stämme auch bei Gesunden vorkommen können.

Trotz typischer klinischer Symptome und Befunde gelingt es aber oft nicht, einen *Staphylococcus-aureus*-Stamm anzuzüchten, da viele Patienten bereits zuvor mit Antibiotika behandelt wurden. Ein negativer bakteriologischer Befund schließt also das Vorliegen eines TSS nicht aus.

Nachweis von Antikörpern gegen TSST-1 und SEB im Serum

Serologische Untersuchungen beim TSS können ergänzend herangezogen werden. Eine hoher Titer von Antikörpern gegen TSST-1 zu Beginn der Erkrankung kann als protektiv angesehen werden, wohingegen ein niedriger Antikörperspiegel zu Beginn der Erkrankung (ggf. mit einem späteren Anstieg) als Hinweis auf ein TSS gewertet werden muss. Auch in größeren Studien zeigte sich, dass Antikörpertiter gegen TSST-1 von akut an TSS erkrankten Patienten und gesunden Kon-

Tabelle 3
Differenzialdiagnosen zum TSS

Staphylococcus aureus

Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)
Sepsis bzw. septischer Schock

A-Streptokokken

Scharlach
Streptokokken-TSS
Sepsis bzw. septischer Schock

Andere Erreger

Meningokokkensepsis
Leptospirose
Rickettsiosen
Masern
Enterovirusinfektionen

Nicht-infektiöse Erkrankungen

TEN/Stevens-Johnson-Syndrom/Erythema
exsudativum multiforme
Kawasaki-Syndrom
Arzneimittelnebenwirkung

Klinisch-chemische und
hämatologische Diagnostik

trollpersonen signifikant unterschiedlich sind. So fanden Crass et al. bei akut Erkrankten in 82% niedrige Antikörperspiegel, bei Gesunden hingegen hohe Titer vom >1:800. Ein Großteil der Normalpopulation scheint daher durch stille Feiung geschützt.

Strikte Indikationen zur Durchführung der serologischen Untersuchungen sind ungewöhnliche bzw. rekurrente Verläufe.

Weitere mikrobiologische Untersuchungen

Negative Ergebnisse von Untersuchungen zum Nachweis von Antikörpern gegen Leptospiren, Legionellen, Rickettsien, Rötelnvirus und Masernvirus unterstützen die Verdachtsdiagnose „TSS“.

Sonstige Diagnostik

Im Blut können eine mäßiggradige bis ausgeprägte Leukozytose nachweisbar sein sowie eine deutliche Neutrophilie

(80–90%) mit Linksverschiebung im Differenzialblutbild, Thrombozytopenie, beschleunigter BSR sowie erhöhten Werten bei Transaminasen, Amylase, Harnstoff, Kreatinin, Bilirubin, Kreatinphosphokinase. Oft findet sich eine Hypokalzämie (Tabelle 2).

Bei einigen Patienten lassen sich Proteinurie, Leukozyturie und Hämaturie nachweisen. Je nach klinischer Symptomatik sind EKG, EEG, Röntgen- bzw. Ultraschalluntersuchungen indiziert.

Differenzialdiagnosen

In Tabelle 3 sind die wichtigsten Erkrankungen aufgeführt, die als Differenzialdiagnosen zum TSS in Betracht kommen.

Tabelle 4.
Differenzierung zwischen TSS und Kawasaki-Syndrom

	Toxisches Schocksyndrom	Kawasaki-Syndrom
Alter der Patienten	meist >14 Jahre	In etwa 85% <4 Jahre
Durchschnittsalter	23 Jahre (menstruell) 30 Jahre (nicht-menstruell)	
Saisonalität	–	Später Winter, Frühjahr
Männlich:Weiblich	1:1,2	1,5:1
Assoziation zur Menstruation	+ (in 50–60%)	–
Hypotonie	+	–
Diarrhö	+	–
Zervikale LKS	–	+ (in 50–75%)
Myalgie	+	–
Herzbeteiligung	((+))	+
Kreatininanstieg	+ (in 60–90%)	–
<i>Staphylococcus-aureus</i> -Nachweis	+	–
Thrombozytenzahl	↓	↑ (nach dem 7. Tag)

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen TSS und Kawasaki-Syndrom.

Tabelle 5
Therapie des TSS

Organspezifische supportive Maßnahmen gegen

Hypotension
Arrhythmie
Ateminsuffizienz
Niereninsuffizienz

Therapie der Infektion

i.-v.-Antibiotikum: Isoxazolylinpenizillin oder Cephalosporin der 2. Generation in Kombination mit Clindamycin (Stopp der Toxinproduktion)
Fokussanierung (Drainage, Spülung)
Fremdkörperentfernung (z. B. Tampon)
Methylprednisolon/Dexamethason?
Immunglobulin?

Im Vordergrund stehen Schockbehandlung und Monitoring auf der Intensivtherapiestation.

► **Antibiotiktherapie**

Clindamycin spielt eine besondere Rolle.

► **Immunglobuline**

► **Steroide**

► **Komplikationen**

► **Prognose**

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen TSS und Kawasaki-Syndrom (Tabelle 4). Die Patienten mit Kawasaki-Syndrom sind meist weniger schwer erkrankt als TSS-Patienten. Gemeinsam sind beiden Krankheiten das hohe Fieber, die Hyperämie der Schleimhäute und das Exanthem mit nachfolgender Hautschuppung. Myalgie, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall und Schock fehlen jedoch beim Kawasaki-Syndrom.

Therapie

TSS-Patienten bedürfen eines engmaschigen Monitorings (u. a. Messung des zentralen Venendrucks) auf einer Intensivtherapiestation. Tabelle 5 enthält die wichtigsten therapeutischen Maßnahmen beim TSS. Im Vordergrund steht die symptomatische Therapie, d. h. v. a.

eine konsequente Schocktherapie mit Volumen- und Elektrolytsubstitution, ggf. auch eine Gabe von Sauerstoff und Katecholaminen.

Bei Lungen- oder Nierenversagen sind künstliche Beatmung bzw. Dialysebehandlung indiziert. Tamponentfernung und Vaginallavage sollten in jedem Fall von menstruationsassoziiierter Erkrankung erfolgen. Bei bekanntem infektiösen Fokus (z. B. Sinusitis, Arthritis, Osteomyelitis) sind ggf. chirurgische Eingriffe (mit Drainage und evtl. Spülung) indiziert.

Nach Abnahme entsprechender Kulturen ist eine frühzeitige Behandlung mit einem gegenüber Staphylokokken wirksamen ► **Antibiotikum** (z. B. Isoxazolylinpenizillin oder Zephalosporin der 2. Generation) einzuleiten. Clindamycin soll darüber hinaus die Toxinproduktion hemmen und erscheint daher als Kombinationspartner sinnvoll.

Die Antibiotika verhindern eine weitere Toxinproduktion sowie Rezidive, haben aber auf die bereits eingetretenen toxinbedingten Organschädigungen keinen Einfluss. Die Applikation erfolgt intravenös und in Maximaldosen. Toxin produzierende MRSA-Stämme kommen extrem selten vor.

Auch eine antitoxische Behandlung mit ► **Immunglobulinen** erscheint pathophysiologisch sinnvoll. Dickgiesser fand bei verschiedenen käuflichen Immunglobulinen hohe Titer an Anti-TSST-1-Antikörpern (mit einer Streubreite von 1:80–1:4200) [2]. Klinisch kontrollierte Studien liegen hierzu allerdings nicht vor, ebenso wenig Daten über eine theoretisch denkbare Plasmapherese zur Toxinelimination.

Durch eine kurzzeitige Gabe von ► **Steroiden** können Fieberdauer und schwere Erkrankungen günstig beeinflusst werden. In therapieresistenten Fällen mit schwerer Schocksymptomatik wird eine frühzeitige Behandlung mit Methylprednisolon (10–30 mg/kg KG/Tag) empfohlen. Es gibt aber hierzu keine kontrollierten Studien.

Verlauf, Komplikationen, Prognose

Es gibt beim TSS z. T. sehr schwere, aber auch mildere Verläufe. Letztere werden oft nicht als TSS erkannt und dementsprechend nicht adäquat behandelt, was Rezidive zur Folge haben kann (dies betrifft v. a. menstruierende Frauen).

Aus der zu Beginn typischerweise vorhandenen Thrombozytopenie kann sich im weiteren Verlauf eine Thrombozytose entwickeln. Das Ausmaß der Hautschuppung kann im Einzelfall sehr unterschiedlich ausgeprägt sein.

Die meisten ► **Komplikationen** sind Folge der verminderten Perfusion durch die Hypotension. Zu den möglichen TSS-Komplikationen zählen Herzinsuffizienz, Arrhythmie, Lungenödem bzw. ARDS, DIC, Niereninsuffizienz, Enzephalopathie, Herpes febrilis. Das „capillary leak syndrome“ kann Perikard- und Pleuraergüsse sowie Aszites zur Folge haben.

Die ► **Prognose** wird v. a. bestimmt von der Dauer des Schocks und dem Ausmaß der Organdysfunktionen. Die Prognose ist umso günstiger, je früher die Dia-

Bei den meisten Patienten kommt es zur kompletten Heilung.

► **Letalität: 2–4%**

Drastische Senkung der Rezidivrate durch adäquate Antibiotikatherapie

gnose gestellt wird und eine effektive Therapie beginnt. Bei den meisten Patienten kommt es zur kompletten Heilung.

Die ► **Letalitätsrate** des TSS wird heute mit etwa 2–4% angegeben. Mögliche Ursachen für einen Exitus letalis sind: Kardiomyopathie, Arrhythmie, respiratorische Insuffizienz und (selten) Blutungen. Es handelt sich dabei überwiegend um Fälle von nicht-menstruellem TSS (am ehesten bedingt durch nicht oder zu spät gestellte Diagnose).

Zu den potenziellen Folgeerscheinungen eines TSS zählen der (reversible) Verlust von Finger- und Zehennägeln nach 1–2 Monaten, prolongierte Müdigkeit und Muskelschwäche.

Rezidive und Prophylaxe

Bei Frauen, die ein TSS durchgemacht haben, besteht ein erhöhtes Risiko, erneut an einem TSS zu erkranken. Das Auftreten eines TSS-Rezidivs (bzw. von Rezidiven) kann Folge ausgebliebener bzw. inadäquater Therapie oder ungenügender Produktion von Anti-TSST-1-Antikörpern sein. Es wurde berichtet, dass eine adäquate Antibiotikatherapie die Rezidivrate von 65% auf <1% senken kann.

Durch Verzicht auf die Verwendung von Tampons kann das Risiko eines menstruellen TSS reduziert werden.

Literatur

1. Chesney PJ, Davis JP (1998) Toxic shock syndrome. In: Feigin RD, Cherry JD (eds) Textbook of pediatric infectious diseases, 4th edn. Saunders, Philadelphia, pp 830–852
2. Dickgiesser N (1991) Toxic shock syndrome. In: Hahn H, Schmidt G (Hrsg) Staphylokokken-Infektionen. SMV Verlagsgesellschaft, Gräfelfing, S 68–75
3. Schlievert PM, Mac Donald KL (1998) Toxic shock syndrome. In: Gorbach SL, Bartlett JG, Blacklow NR (eds) Infectious diseases, 2nd edn. Saunders, Philadelphia, pp 1689–1696
4. Stevens DL (1996) The toxic shock syndromes. Infect Dis Clin North Am 10: 727–746
5. Todd JK (1997) Toxic shock syndromes. In: Long SS, Pickering LK, Prober CG (eds) Pediatric infectious diseases. Churchill Livingstone, New York, pp 107–111
6. Waldvogel FA (2000) *Staphylococcus aureus* (including staphylococcal toxic shock). In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R (eds) Principles and practice of infectious diseases, 5th edn. Churchill Livingstone, Philadelphia, pp 2069–2076

Fragen zur Zertifizierung

1. Das Toxic-shock-Syndrom

- I. Ist eine seltene Erkrankung
  - II. Tritt nur bei Frauen im fertilen Alter auf
  - III. Betrifft beide Geschlechter
  - IV. Kommt auch bei Kindern vor
  - V. Ist meist eine nosokomiale Erkrankung
- a) I und II treffen zu
  - b) I, IV und V treffen zu
  - c) III und IV treffen zu
  - d) I, III und IV treffen zu
  - e) I und III treffen zu

2. Das Toxic-shock-Syndrom

- I. Tritt immer im Zusammenhang mit der Menstruation auf
  - II. Wird durch *Staphylococcus-aureus*-Toxine ausgelöst
  - III. Ist Folge einer Infektion durch Toxin produzierende *Staphylococcus-aureus*-Stämme
  - IV. Ist Folge einer Besiedlung mit Toxin produzierenden *Staphylococcus-aureus*-Stämmen
  - V. Wird nur durch ein definiertes *Staphylococcus-aureus*-Toxin ausgelöst
- a) I, II, III und IV treffen zu
  - b) II, III und IV treffen zu
  - c) III, IV und V treffen zu
  - d) I und II treffen zu
  - e) II und III treffen zu

3. Die *Staphylococcus-aureus*-Toxine beim Toxic-shock-Syndrom

- I. Fungieren als Antigene
  - II. Fungieren als Superantigene
  - III. Lösen eine massive Entzündung aus
  - IV. Bewirken nur eine minimale Entzündungsreaktion
  - V. Sind die Ursache für eine massive Ausschüttung von Zytokinen
- a) I, III und V treffen zu
  - b) I, IV und V treffen zu
  - c) II, III und V treffen zu
  - d) II, IV und V treffen zu
  - e) II und III treffen zu

4. Das Toxic-shock-Syndrom

- I. Beginnt allmählich
  - II. Beginnt akut bis perakut
  - III. Kann mit Blutdruckabfall einhergehen
  - IV. Geht immer mit einer Hypotension einher
  - V. Manifestiert sich klinisch v. a. mit Fieber, Exanthem (gefolgt von Hautschuppung) und Herz-Kreislauf-Symptomen (Hypotension)
- a) I, III und V treffen zu
  - b) I, IV und V treffen zu
  - c) II, IV und V treffen zu
  - d) II und III treffen zu
  - e) II und V treffen zu

5. Die Diagnose „Toxic-shock-Syndrom“ basiert v. a.

- I. Auf klinischen Symptomen und Befunden
  - II. Auf klinisch-chemischen und hämatologischen Befunden
  - III. Auf mikrobiologischen Befunden
  - IV. Auf immunologischen Befunden
  - V. Auf dem Toxinnachweis
- a) I und II treffen zu
  - b) I und IV treffen zu
  - c) I und V treffen zu
  - d) Nur I trifft zu
  - e) Nur V trifft zu

6. Die Therapie des Toxic-shock-Syndroms

- I. Besteht v. a. in supportiven Maßnahmen
  - II. Umfasst auch die Gabe von Antibiotika
  - III. Besteht in der Beseitigung eines infektiösen Fokus
  - IV. Umfasst die Gabe von Immunsuppressiva
  - V. Erfordert die Gabe von Immunglobulinpräparaten
- a) I, II und III treffen zu
  - b) I, III und V treffen zu
  - c) I und II treffen zu
  - d) I und IV treffen zu
  - e) Nur II trifft zu

Einsendeschluss: 06. Februar 2002

Antworten in Heft 2/2002

Antworten aus Heft 10/01: 1b, 2e, 3c, 4c, 5a, 6c, 7d, 8d, 9b, 10a

Ihre Abonentennummer

								/		

Monatsschrift Kinderheilkunde

Zertifizierungsfragebogen

Wenn Ihre Abonentennummer vor dem Schrägstrich weniger als sieben Ziffern aufweist, füllen Sie die verbliebenen Felder vorne bitte mit Nullen auf.

Vorname/
Name:

Straße:

Plz./Ort:

Fax:

Wenn Sie an der Zertifizierung teilnehmen möchten, verwenden Sie bitte den maschinenlesbaren Originalfragebogen aus Ihrer Zeitschrift. Der hier in LINK aufgelegte Fragebogen ist nicht maschinenlesbar und kann deswegen für die Auswertung nicht berücksichtigt werden. Alternativ besteht auch die Möglichkeit der Online-Zertifizierung unter <http://www.medizinonline.de>

Druckschrift erforderlich

⇓ Faxanschlag ⇓

Dieser Antwortbogen bezieht sich auf die Fragen des vorausgehenden Fortbildungsbeitrags.

Aus Gründen der korrekten Identifizierung können an dieser Aktion nur Individualabonenten der MONATSSCHRIFT KINDERHEILKUNDE teilnehmen; deswegen ist die Angabe Ihrer Abonentennummer obligatorisch. Ihre Abonentennummer finden Sie auf dem Adressaufkleber Ihrer Zeitschrift zu Beginn der dritten Zeile bzw. auf Ihrer Rechnung neben dem Wort „Auftragsnummer“. Ihre Abonentennummer besteht aus bis zu sieben Ziffern, einem Schrägstrich und zwei darauffolgenden Ziffern (siehe rechts).

(In Ausnahmefällen fragen Sie nach Ihrer Abonentennummer unter 06221/3450.)

SAG Pf. 105160 69041 Heidelberg
PVST DPAG Entg. bez. A10477
1046917/01 108916 1894
00108 0041/08 0041/08

Abonentennummer (Beispiel)

Nicht komplett ausgefüllte oder unleserliche Fragebögen bzw. Fragebögen mit falscher Abonentennummer bzw. falscher Faxnummer können nicht berücksichtigt werden. Darum sollte auf dem maschinenlesbaren Bogen nichts durchgestrichen oder überschrieben werden.

Die richtigen Antworten erscheinen in der übernächsten Ausgabe der MONATSSCHRIFT KINDERHEILKUNDE am Ende der Rubrik „Fortbildung“.

Im Dezember 2001 faxen wir Ihnen das nächste Mal die Auswertung Ihrer eingesandten Antwortbögen zu. Darum benötigen wir zwingend Ihre Faxnummer.

Noch einfacher ist die Teilnahme online unter www.medizinonline.de. Wenn Sie Ihren Fragebogen online ausfüllen, erhalten Sie die Auswertung per E-Mail. Zusätzlich können Online-Nutzer Ihren aktuellen Ergebnisstand jederzeit abrufen; das aktuelle Ergebnis natürlich erst nach dem Einsendeschluss.

Mit dem Absenden des Antwortbogens stimme ich zu, dass meine Daten für die Auswertung der Zertifizierungsbögen gespeichert werden und ich an die angegebene Faxnummer eine Auswertung geschickt bekomme. Der Verlag versichert, dass die Daten nur zu diesem Zweck verwendet werden.

Einsendeschluss (Eingang im Verlag) ist der 06.02.2002

Senden Sie den Fragebogen bitte nicht auf dem Postweg zurück, sondern an: **Fax-Nummer: 06221/616477**
(nur in Originalgröße faxen)

Antwortfeld: (nur eine Antwort pro Frage ankreuzen)

	a	b	c	d	e
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐

⇓ Faxanschlag ⇓

Ort, Datum

Unterschrift

s001120100358