Since January 2020 Elsevier has created a COVID-19 resource centre with free information in English and Mandarin on the novel coronavirus COVID-19. The COVID-19 resource centre is hosted on Elsevier Connect, the company's public news and information website.

Elsevier hereby grants permission to make all its COVID-19-related research that is available on the COVID-19 resource centre - including this research content - immediately available in PubMed Central and other publicly funded repositories, such as the WHO COVID database with rights for unrestricted research re-use and analyses in any form or by any means with acknowledgement of the original source. These permissions are granted for free by Elsevier for as long as the COVID-19 resource centre remains active.

Síndrome respiratorio agudo grave

Tomàs Pumarola^a y Àngela Domínguez^b

^aServicio de Microbiología. Institut Clínic d'Infecció i Immunologia (ICII). Hospital Clínic. Barcelona.

^bDirecció General de Salut Pública. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Barcelona. España.

Antecedentes de la alerta mundial

El 15 de marzo de 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó una alerta global para establecer consejos en respuesta a diversos brotes de enfermedad respiratoria que se habían producido en diferentes países de Asia¹.

Se trataba de un proceso de causa desconocida del que había que sospechar: cuando una persona presentaba fiebre superior a 38 °C y síntomas de infección respiratoria del tracto superior (tos o dificultad respiratoria) y cuando se produjera una enfermedad respiratoria aguda que resultara en fallecimiento y no se dispusiera de necropsia, en ambos casos junto a uno de los siguientes antecedentes en los 10 días previos al inicio de los síntomas: haber tenido contacto estrecho con otro caso o haber viajado a alguna de las áreas afectadas.

El caso probable se definió como aquel caso sospechoso cuya radiografía pusiera de manifiesto infiltrados compatibles con neumonía o síndrome de distrés respiratorio, o bien aquel caso probable cuya autopsia fuera compatible con la enfermedad del distrés respiratorio sin una causa identificable².

El nuevo síndrome lo identificó el Dr. Carlo Urbani, epidemiólogo de la oficina de la OMS en Hanoi, cuando examinó a un paciente con una forma grave de neumonía cuya etiología no pudo conocer.

El 10 de marzo de 2003, 22 trabajadores de un hospital francés de Hanoi presentaban un síndrome respiratorio similar, y un día después, el 11 de marzo, se detectaron diversos casos del mismo síndrome entre trabajadores hospitalarios de Hong Kong. Para entonces, la OMS ya estaba estrechando la vigilancia de una enfermedad respiratoria atípica, puesto que desde el 10 de febrero el personal de su oficina en Pekín (Beijing) estaba estudiando un brote de neumonía atípica que se había iniciado en noviembre de 2002 y que había afectado a 305 personas de la provincia de Guandong (China), principalmente personal sanitario y sus contactos más cercanos. El brote había ocasionado la muerte a cinco personas.

Las recomendaciones estaban dirigidas a prevenir la transmisión internacional de la enfermedad mediante la alerta de los profesionales y la población, la vigilancia epidemiológica y la implementación de medidas para el tratamiento de los casos sospechosos y probables.

Los días 14 y 15 de marzo, además de los casos de los que se tenía conocimiento en Hanoi, Hong Kong y Pekín, se

supo que en Toronto (Canadá) se habían diagnosticado cuatro casos de neumonía atípica (dos de los cuales habían fallecido) y otro más en Singapur.

La decisión de lanzar la alerta global se sustentaba en los siguientes factores:

- La etiología de la enfermedad no se conocía. Los datos epidemiológicos disponibles indicaban que el período de incubación era corto, de 2 a 10 días, lo que indicaba que no se trataba de otras neumonías atípicas, como las producidas por *Mycoplasma*³ y *Chlamydia*⁴. Por otro lado, la transmisión de persona a persona era muy eficiente, lo que descartaba que la causa de la neumonía atípica fuera *Legionella*, en la que no se produce este tipo de transmisión⁵.

- El brote de la nueva enfermedad suponía un riesgo importante para el personal sanitario que atendía a los pacientes, así como para sus familiares y otros contactos estrechos.

Los datos epidemiológicos disponibles indicaban que la mayoría de los casos habían tenido relación directa (por gotas) o indirecta (por contacto) con otros casos, pero al no poder descartarse la transmisión por aire⁶, el 19 de marzo la OMS recomendó la adopción de precauciones para evitar la transmisión por gotas, por contacto y por aire⁷.

Se estaba en una fase preliminar de la investigación de la epidemia y no se disponía de pruebas de laboratorio para diagnosticar los casos, y no se conocía exactamente ni el período de incubación ni el de transmisión (que no tiene por qué coincidir con el período en el que tienen lugar las manifestaciones clínicas). Todo esto hacía difícil determinar con precisión cuál había sido la fecha de exposición y, por lo tanto, el tipo de transmisión para cada caso.

Aunque se ha apuntado que para algunos casos la exposición pudiera haber sido viajar en el mismo avión que un caso, este dato no se ha podido confirmar.

Sin embargo, puesto que para otras enfermedades se ha descrito la transmisión aérea en los viajes en avión a través de los núcleos goticulares que contienen microorganismos procedentes de personas enfermas⁸, parece razonable extremar las precauciones para evitar la transmisión de esta nueva enfermedad. Las últimas recomendaciones de la OMS que definen los contactos de los casos sospechosos que viajan en aviones son una aportación en este sentido².

- A pesar de haber utilizado empíricamente diferentes antibióticos y antivirales, estos tratamientos no parecía que fueran efectivos. La realización de estudios colaborativos bien diseñados, como los que se están realizando en la actualidad⁹ permitirán conocer de manera adecuada la eficacia de estos tratamientos farmacológicos.

- Aunque por entonces el número de casos que se conocía no era muy elevado, se había observado que en una proporción importante progresaban rápidamente a insuficiencia respiratoria, requerían cuidados intensivos y, ocasionalmente, producían el fallecimiento.

Correspondencia: A. Domínguez.
Direcció General de Salut Pública.
Departament de Sanitat i Seguretat Social.
Travessera de les Corts, 131-159. 08028 Barcelona. España.

Recibido el 15-04-2003; aceptado para su publicación el 22-04-2003.

– Se trataba de una enfermedad que aunque originariamente había tenido lugar en Asia estaba afectando ya a la población de diversos continentes. En la actualidad, con la excepción de Oceanía (también hubo un caso sospechoso pero se descartó), ha afectado a sujetos procedentes de todos los continentes.

Identificación del agente etiológico

Investigaciones preliminares realizadas con un número limitado de pacientes en Canadá¹⁰ y en EE.UU.¹¹, sugerían que el metapneumovirus humano (HMPV), un nuevo virus perteneciente a la familia *Paramyxoviridae*, género *Metapneumovirus*, podía estar implicado en el síndrome respiratorio agudo grave o SRAG (SARS, según sus siglas en inglés). El HMPV se describió por primera vez hace sólo dos años¹² y se conoce su papel en infecciones del tracto respiratorio en poblaciones de diferentes grupos de edad¹³⁻¹⁵. Sin embargo, en los trabajos más recientes que analizan muestras clínicas de un mayor número de casos se concluye que el HMPV no tendría ningún papel etiopatogénico en el SRAG. Por el contrario, estudios más recientes indican que el probable agente etiológico podría ser un nuevo coronavirus no descrito anteriormente.

Los coronavirus son virus que se identificaron en 1965^{16,17} a partir de secreciones respiratorias de personas con resfriado común y que al microscopio electrónico presentan una característica morfología en corona solar que da nombre a la familia¹⁸.

En el pasado mes de marzo, laboratorios de China¹⁹, EE.UU.²⁰, Canadá¹⁰ y Alemania²¹ consiguieron aislar, en cultivo de células de riñón de mono, un virus no reconocido hasta el momento a partir de muestras clínicas de pacientes afectados de SRAG. Estos aislamientos virales han permitido su observación al microscopio electrónico, el desarrollo de técnicas moleculares de amplificación genética para estudios de secuenciación y de detección del virus en las muestras biológicas de los pacientes, así como el desarrollo de técnicas serológicas para los estudios epidemiológicos y de identificación de pacientes.

Mediante la utilización de estas técnicas se ha detectado, como posible agente etiológico del SRAG, un nuevo virus que ha resultado ser idéntico en los aislados de los diferentes laboratorios y que inicialmente estaría relacionado con el género *Coronavirus*. De su observación al microscopio electrónico se extrae que posee la morfología característica de este género¹⁹⁻²¹ y una homología de los fragmentos del genoma secuenciados del 50-60% con el resto de coronavirus conocidos²¹. Adicionalmente, las tinciones inmunológicas de las células infectadas en cultivo celular han resultado positivas al utilizar anticuerpos policlonales frente a los coronavirus del grupo I²⁰. Se ha propuesto denominar al nuevo virus como Coronavirus Urbani asociado al SRAG²⁰ en homenaje al Dr. Carlo Urbani, que falleció a consecuencia del SRAG, en plena investigación de la epidemia.

Recientemente, Peiris et al¹⁹ han publicado los resultados virológicos obtenidos a partir de 50 pacientes afectados de SRAG en Hong Kong. Se ha detectado seroconversión frente al nuevo virus en la totalidad de los pacientes en los que se obtuvieron sueros pareados (32/50) y se ha amplificado el ARN viral en 22 de los 44 aspirados nasofaríngeos disponibles y en 10 de las 18 muestras de heces procesadas.

Ksiazek et al²⁰ demuestran la infección por el nuevo virus en 18 pacientes diagnosticados de SRAG procedentes de China, Vietnam, Canadá y Taiwán, mediante aislamiento, amplificación genética (RT-PCR) o serología. Drosten et al²¹,

mediante la utilización de una RT-PCR detectan el ARN viral en el 100% de los pacientes estudiados con diagnóstico de SRAG, en el 23% de los pacientes con sospecha de SRAG y en ninguno de los contactos sanos estudiados.

Poutanen et al¹⁰, en un estudio que incluye los 10 primeros casos de SRAG en Canadá, han aislado el nuevo coronavirus a partir de cinco pacientes y han conseguido amplificar el ARN viral a partir del lavado broncoalveolar (BAL) de tres pacientes, todos ellos con aislamiento viral positivo. También han amplificado el ARN del HMPV en el BAL y en el frotis nasofaríngeo de cinco pacientes, cuatro de ellos con aislamiento positivo para coronavirus, y a partir del frotis nasofaríngeo de un contacto asintomático de uno de los pacientes. Sin embargo, como se ha comentado, en el resto de trabajos publicados¹⁹⁻²¹, la búsqueda sistemática del HMPV ha sido repetidamente negativa.

Los coronavirus²² pertenecen a la familia *Coronaviridae* y al género *Coronavirus*. Se caracterizan por ser virus ARN monocatenarios de polaridad positiva y presentar una cápside de simetría helicoidal recubierta por una envoltura de naturaleza lipídica, cuyas proyecciones de superficie confieren un característico aspecto de corona en la observación al microscopio electrónico, que da nombre a este grupo de virus. Los coronavirus son causa de enfermedades infecciosas altamente prevalentes en el hombre y en los animales (rata, pollo, pato, cerdo, perro, gato, conejo, vaca). Se han descrito tres grupos de coronavirus, donde los virus adscritos a cada uno de ellos se identifican por su huésped natural, por sus relaciones antigénicas y por la secuencia de nucleótidos. La mayoría de coronavirus infectan de forma natural a una única especie animal o a especies estrechamente relacionadas. La infección del huésped natural puede ocasionar infección sistémica, aunque con mayor frecuencia son causa de infección localizada, especialmente del tracto respiratorio y gastrointestinal. El cuadro clínico que ocasiona parece estar más relacionado con la liberación de mediadores que con la lesión celular²³.

Se ha aislado una gran variedad de cepas de coronavirus serológica y biológicamente distintas en roedores y aves infectadas. Sin embargo, la importancia de esta variabilidad viral en los coronavirus humanos (CVH) se desconoce, en gran medida debido a la dificultad de propagar estos virus en cultivo celular. La capacidad de recombinación y mutación observada en los coronavirus animales²² hace pensar que esto también ocurre en los CVH, pudiendo ser causa, en un momento determinado, de cambios en la patogenicidad viral.

Los CVH se hallan ampliamente distribuidos y son causa de procesos benignos del tracto respiratorio superior y en ocasiones del tracto gastrointestinal, con una distribución estacional en invierno y primavera. Así, pueden llegar a ser los responsables del 35% de los procesos de tracto respiratorio superior durante los períodos de mayor actividad viral. Adicionalmente puede estimarse que el 15% de los resfriados comunes en adultos se deben a CVH¹⁷. Hasta este momento, los procesos del tracto respiratorio inferior ocasionados por los CVH han sido esporádicos. En un estudio realizado en reclusos²⁴, la infección por CVH se asoció con neumonía y reactividad pleural en el 33% de los casos.

Es posible que bajo determinadas circunstancias epidemiológicas los CVH puedan causar infecciones del tracto respiratorio superior. En niños con asma o bronquitis recurrente se han descrito agudizaciones de estos procesos durante la infección por CVH. En población de edad avanzada y en adultos con enfermedades pulmonares crónicas se ha demostrado una asociación entre la infección por CVH y la exacerbación de la sintomatología respiratoria²⁵⁻²⁷.

Si bien puede especularse ampliamente acerca del papel del coronavirus en la etiología del SRAG, actualmente se desconoce la historia natural y la patogenia de la enfermedad. Es necesaria la realización de estudios amplios que incluyan grupos de control apropiados. Para esto se han preparado técnicas específicas de aislamiento, de amplificación de ácidos nucleicos, de microscopia electrónica e histológicas que se están utilizando para detectar el virus en las muestras clínicas de pacientes con sospecha de SRAG. También se han desarrollado técnicas serológicas (inmunofluorescencia indirecta y enzimoimmunoanálisis) que se están utilizando como marcadores de infección para los estudios epidemiológicos. Los argumentos a favor del coronavirus como agente etiológico del SRAG son en la actualidad: *a)* detección del virus en varios laboratorios a partir de muestras clínicas de pacientes; *b)* seroconversión en la gran mayoría de pacientes con diagnóstico de SRAG; *c)* ausencia de otros patógenos respiratorios, y *d)* los coronavirus humanos son causantes de infección respiratoria aunque de menor gravedad que la causada por el nuevo coronavirus.

El nuevo coronavirus ha sido aislado o detectado fundamentalmente en muestras respiratorias (frotis faríngeo, aspirado nasofaríngeo, esputo, lavado broncoalveolar y biopsia pulmonar), lo que apoyaría la eliminación viral a partir del tracto respiratorio como principal vía de transmisión. Mediante estudios cuantitativos que utilizan una técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a tiempo real²¹, el esputo parece presentar una carga de ARN viral muy superior a la presente en el frotis o el aspirado nasofaríngeo, lo que puede tener implicaciones diagnósticas importantes. También se ha detectado el ARN viral en las heces de una proporción importante de pacientes. Sin embargo, para que esta vía de transmisión pueda ser considerada como tal se deberá demostrar la viabilidad viral en las heces. Se ha conseguido detectar el ARN viral en la sangre, tras concentración del suero por ultracentrifugación²¹. Así, existiría viremia a baja concentración durante la fase clínica de la infección, lo que indicaría que la replicación viral no se halla limitada exclusivamente al tracto respiratorio. Los estudios serológicos realizados hasta la actualidad parecen indicar que la aparición de anticuerpos específicos tiene lugar entre una y dos semanas después del inicio de los síntomas²⁰. La ausencia de detección de anticuerpos en los grupos de población sana estudiados hasta la actualidad podría indicar que hasta ese momento el virus no estaba circulando entre la población.

La ribavirina es un análogo de la guanosina que induce una mutagénesis letal del ARN viral y que posee un amplio espectro de actividad frente a los virus ARN²⁸. Si bien aparentemente algunos pacientes afectados de SRAG han mejorado tras la administración de ribavirina, no existe todavía evidencia suficiente para determinar la eficacia de este fármaco en el tratamiento del SRAG.

Un aspecto importante a considerar es que los coronavirus infectan tanto al hombre como a los animales, por lo que es lógico considerar que la emergencia de una nueva enfermedad podría estar relacionada con la emergencia de un nuevo coronavirus de origen animal que hubiera adquirido la capacidad de infectar al hombre. Probablemente uno de los ejemplos más importantes de infección viral con una elevada tasa de morbimortalidad en el siglo pasado han sido las pandemias por el virus de la gripe. Estas han ocurrido como resultado directo de la introducción de virus de los animales en la población humana. Recientemente se ha demostrado que el virus de la gripe aviar puede replicarse en las células humanas y causar una infección grave, como se demostró en el brote por el subtipo H5N1 del virus de la gripe A en

pollos en Hong Kong el año 1997, en el que una tercera parte (6 de 18) de los casos fueron mortales²⁹. La imposibilidad de este virus para transmitirse eficientemente de persona a persona explica por qué el episodio de 1997 no supuso el inicio de una nueva pandemia³⁰.

Emergencia de nuevas infecciones virales

Con la única excepción del sida, las otras enfermedades que han emergido en las últimas décadas no han tenido capacidad para suponer un desafío para la Salud Pública Internacional, ya que no se transmiten de forma eficiente de persona a persona (virus de la gripe A H5N1, virus Nipah, virus Hendra, hantavirus), porque precisan de vehículo alimentario (variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob) o de un vector (virus West Nile), o porque la transmisión de persona a persona requiere exposición a sangre o fluidos (virus Ebola).

No deja de ser paradójico que en una época en la que se han conseguido controlar e incluso eliminar de amplias regiones de la tierra infecciones virales de primer orden, como la polio o el sarampión, nos hallemos ante un riesgo de emergencia de nuevas infecciones virales en el hombre y los animales. La compleja asociación de importantes cambios sociales, tecnológicos y ecológicos, junto con la capacidad de determinados virus de adaptarse rápidamente a un medio ambiente cambiante, parecen ser las bases que sustentan estas emergencias. Con toda seguridad, el desarrollo de extensas redes de vigilancia epidemiológica y virológica, así como la investigación y desarrollo de nuevas vacunas y fármacos antivirales aportarán las salvaguardas necesarias para limitar el impacto de las enfermedades virales que puedan emerger o repetirse en el futuro.

La colaboración que se ha establecido en el ámbito mundial para el seguimiento y la investigación del SRAG es un claro exponente de cómo la implicación de profesionales e instituciones resulta esencial para avanzar en el conocimiento de nuevas enfermedades, ya que en menos de un mes se ha conseguido identificar un nuevo agente causal. En esta colaboración destaca la participación de:

- Una red virtual de 11 laboratorios de virología de distintos países con la capacidad y el nivel de seguridad requeridos para afrontar el reto de identificar un agente hasta ahora desconocido.
 - Un segundo grupo de epidemiólogos integrado por profesionales de todas las zonas en las que se ha producido transmisión local, cuyo objetivo principal es conocer la cadena epidemiológica del SRAG.
 - Un tercer grupo integrado por 80 clínicos de países donde ha habido casos y que comparten información sobre el tratamiento y que ya ha empezado a realizar ensayos clínicos para evaluar la eficacia de fármacos antivirales.
- Desde la perspectiva de la salud pública, con los datos disponibles hasta la actualidad, puede señalarse que el SRAG es un proceso que presenta una elevada, aunque no uniforme, contagiosidad³¹ frente a la cual no existe, de momento, un tratamiento específico ni se puede establecer un diagnóstico de certeza en las fases iniciales de la enfermedad. Aunque por imperativos propios a la detección de los casos las primeras descripciones pueden estar sesgadas, no deja de llamar la atención que en la más amplia de las series publicadas³², un 50% de los enfermos sean trabajadores sanitarios, y un 11,6% adicional, estudiantes de medicina. Por esto, hasta que no se disponga de nueva información, parece razonable que los servicios sanitarios y de salud pública adopten las precauciones necesarias para minimizar el

riesgo de que aparezcan nuevos casos mediante la adopción de medidas para evitar la transmisión por gotas, por contacto y por aire³³.

Asimismo, si bien en los trabajos preliminares^{6,10} la letalidad podía asociarse a la existencia de enfermedades de base, en el trabajo de Lee et al³², en el que se estudia a un total de 138 pacientes, los resultados del análisis multivariado indican que es la edad avanzada la variable que se asocia a letalidad y no la existencia de enfermedades de base. Por supuesto, habrá que seguir estudiando qué factores determinan la resolución de la enfermedad, pero es evidente que la sensibilidad del sistema sanitario para detectar casos sospechosos y probables puede influir, especialmente en ausencia de pruebas confirmatorias, en la descripción de la historia natural de la enfermedad^{11,34}.

En tanto en cuanto los estudios colaborativos que se están llevando a cabo en el ámbito de la virología, de la clínica y de la epidemiología permitan delimitar el período de transmisión de la enfermedad y las vías por las que un enfermo transmite de forma eficiente el virus, se podrá especificar, ateniéndose a criterios científicos, la duración y condiciones en que deben practicarse tanto el aislamiento de los pacientes como la vigilancia y cuarentena de las personas aparentemente sanas que han estado expuestas^{9,35}.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization. Severe acute respiratory syndrome (SRAS). Wkly Epidemiol Rec 2003;78:81-3.
2. World Health Organization WHO recommended measures for undertaking international travel from areas affected by severe acute respiratory syndrome (SRAS). Wkly Epidemiol Rec 2003;78:97-120.
3. Micoplasmata. En: Hawker J, Begg W, Blair I, Reintje R, Weinsberg J, editores. Communicable disease control handbook. Oxford: Blackwell Sciences, 2001; p. 152-3.
4. Jackson LA, Grayston JT. *Chlamydia pneumoniae*. En: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, editores. Principles and practice of infectious diseases. 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2000; p. 2007-14.
5. Chin J, editor. Control of communicable diseases manual. 17th ed. Washington: American Public Health Association, 2000.
6. Tsang KW, Ho PL, Ooi GC, Yee WK, Wang T, Chan-Yeung M, et al. Cluster of cases of severe acute respiratory syndrome in Hong Kong. N Engl J Med. Published online April 11, 2003. Consultado el 11 de abril de 2003.
7. WHO. Hospital infection control guidance. Disponible en: <http://www.who.int/csr/sras/infectioncontrol/en/print.html>
8. Kenyon TA, Walway SE, Ihle WW, Onorato IM, Castro KG. Transmission of multidrug-resistant *Mycobacterium tuberculosis* during a long airplane flight. N Engl J Med 1996;334:933-8.
9. WHO multicentre collaborative network for severe acute respiratory syndrome (SRAS) diagnosis. Wkly Epidemiol Rec 2003;78:121-8.
10. Poutanen SN, Low DE, Henry B, Finkelstein S, Rose D, Green K, et al. Identification of severe acute respiratory syndrome in Canada. New Engl J Med. Published online March 31, 2003. Consultado el 10 de abril de 2003.
11. CDC. Update: Outbreak of severe acute respiratory syndrome world wide 2003. MMWR. Published online April, 4, 2003. Consultado el 10 de abril de 2003.
12. Van den Hoogen BG, De Jong JC, Groen J, Kuiken T, De Groot R, Fouchier RA, et al. A newly discovered human pneumovirus isolated from young children with respiratory tract disease. Nat Med 2001;7:719-24.
13. Boivin G, Abed Y, Pelletier G, Ruel L, Moisan D, Cote S, et al. Virological features and clinical manifestations associated with human metapneumovirus: a new paramyxovirus responsible for acute respiratory-tract infections in all age groups. J Infect Dis 2002;186:1330-4.
14. Stockton J, Stephenson I, Fleming D, Zambon M. Human metapneumovirus as a cause of community-acquired respiratory illness. Emerg Infect Dis 2002;8:897-901.
15. Greensill J, McNamara PS, Dove W, Flanagan B, Smyth RL, Hart CA. Human metapneumovirus in severe respiratory syncytial virus bronchiolitis. Emerg Infect Dis 2003;9:372-5.
16. Tyrrell DA, Bynoe ML. Cultivation of a novel type of common-cold virus in organ cultures. BMJ 1965;1:1467-70.
17. McIntosh K. Coronaviruses. En: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, editores. Principles and Practice of Infectious Disease. 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2000; p. 1767-70.
18. Vabret A, Brouard J, Petitjean J, Eugene-Ruellan G, Freymuth F. Human coronavirus infections: importance and diagnosis. Presse Med 1998;27:1813-7.
19. Peiris JSM, Lai ST, Poon LLM, Guan Y, Yam LYC, Lim W, et al. Coronavirus as a possible cause of severe acute respiratory syndrome. Lancet. Published online April 8, 2003. Consultado el 10 de abril de 2003.
20. Ksiazek TG, Erdman D, Goldsmith C, Zaki SR, Peret T, Emery S, et al. A novel coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome. New Engl J Med. Published online April 10, 2003. Consultado el 10 de abril de 2003.
21. Drosten C, Günther S, Preiser W, Van der Werf S, Brodt HR, Becker S, et al. Identification of a novel coronavirus in patients with severe acute respiratory syndrome. N Engl J Med. Published online March 31, 2003. Consultado el 10 de abril de 2003.
22. Holmes KV. Coronaviruses. En: Knipe DM, Howley DM, editores. Fields Virology, 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2001; p. 1187-203.
23. Linden M, Greiff L, Andersson M, Svensson C, Akerlund A, Bende M, et al. Nasal cytokines in common cold and allergic rhinitis. Clin Exp Allergy 1995;25:166-72.
24. Wenzel RP, Hendley JO, Davies JA, Gwaltney JM. Coronavirus infections in military recruits: three-year study with coronavirus strains OC43 and 229E. Am Rev Respir Dis 1974;109:621-4.
25. Falsey AR, McCann RM, Hall WJ, Criddle MM, Formica MA, Wycoff D, et al. The "common cold" in frail older persons: impact of rhinovirus and coronavirus in a senior daycare center. J Am Geriatr Soc 1997;45:706-11.
26. Nicholson KJ, Kent J, Ireland DC. Respiratory viruses and exacerbations of asthma in adults. BMJ 1993;307:982-6.
27. Wiselka MJ, Kent J, Cookson JB, Nicholson KG. Impact of respiratory virus infection in patients with chronic chest disease. Epidemiol Infect 1993;111:337-46.
28. Crotty S, Maag D, Arnold JJ, Zhong W, Lau JY, Hong Z, et al. The broad-spectrum antiviral nucleoside ribavirin is an RNA virus mutagen. Nat Med 2000;6:1375-9.
29. Bender C, Hall H, Huang J, Klimov A, Cox N, Hay A, et al. Characterization of the surface proteins of influenza A (H5N1) viruses isolated from humans in 1997-1998. Virology 1999;254:115-23.
30. Claas EC, Osterhaus AD, Van Beek R, De Jong JC, Rimmelzwaan GF, Senne DA, et al. Human influenza A H5N1 virus related to a highly pathogenic avian influenza virus. Lancet 1998;351:472-7.
31. Drazen JM. Case clusters of the severe acute respiratory syndrome. N Engl J Med. Published online March 31, 2003. Consultado el 10 de abril de 2003.
32. Lee N, Llui D, Wu A, Chan P, Cameron P, Joynt GM, et al. A major outbreak of severe acute respiratory syndrome in Hong Kong. N Engl J Med. Published online April 7, 2003. Consultado el 10 de abril de 2003.
33. Garner JS. Guideline for isolation precautions in hospitals. The Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Infect Control Hosp Epidemiol 1996;17:53-80.
34. World Health Organization. One month into the global SRAS outbreak: status of the outbreak and lessons for the immediate future. Disponible en: http://www.who.int/csr/don/2003_04_11/en/print.html
35. CDC. Severe acute respiratory syndrome (SRAS) and coronavirus testing- United States, 2003. MMWR 2003;52:297-302.